


Chao He

傷科補要

四冊



W O
700
C533s
1818

Ch'ien, Hsü-ch'ang

Shang K'o p'u-yao (4 chüan)

Important additions to the study of
Disorders. With 20 plates.

See CKIHTTT. 3310-

Foreword of 1818

WB-

48

FRENCH BOOKSTORE
PEIPING (CHINA)
北平法文圖書館

455151

FR OCT 1950

End of Part 1

FRENCH BOOKSTORE
PEIPING (CHINA)
北平法文圖書館



重傷痛極何妨代脉。可以醫療。不須驚愕。欲知其要。
細心習學。

脉訣

傷科之脉。須知確鑿蓄血之症。脉宜洪大。失血之脉。洪大難握。蓄血在中。牢大却宜沉濇。而微速愈者稀。失血諸症。脉必現芤。緩小可喜。數大甚憂。浮芤緩濇。失血者宜若數。且大邪勝難醫。蓄血脉微。元氣必虛。脉症相反。峻猛難施。左手三部浮緊而弦。外感風寒。右手三部洪大而實。內傷蓄血。或沉或伏。寒凝氣束。乍疎乍數。傳變莫度。沉滑而緊。痰瘀之作。浮滑且數。風痰之惡。六脉模糊。吉凶難摸。和有神雖危不哭。

之衆也。足心者卽踵之中也。跟骨者跟足後根之骨也。趾者足之指也。其數五。名爲趾者。別於手也。居內之大者。名大趾。第二趾。名大趾之次趾。第三趾。名中趾。第四趾。名小趾之次趾。第五趾。居外之小者。名小趾。足之指節。亦與手指節同。其大趾之本節後。內側圓骨形突者。名核骨。三毛者。足大趾爪甲後爲三毛。毛後橫紋爲聚毛。踵者。足下面着於地之謂也。俗名脚底板。

也。胫骨者。俗名賺脛骨也。其骨兩根。在前者名成骨。又名骭骨。形粗。膝外突出之骨也。在後者名輔骨。形細。膝內側之小骨也。伏兔者。髌骨前膝之上起肉。似俯兔。故曰伏兔。膝解者。膝之節解也。臄骨者。膝上蓋骨也。連骸者。膝外側二高骨也。臄者。膝後屈處。俗名腿凹也。臄者。下腿肚也。一名腓腸。俗名小腿肚。蹠骨者。胫骨之下。足附之上。兩旁突出之高骨。在外爲外踝。在內爲內踝也。足者。下體所以趨步也。俗名腳跗骨者。足背也。一名足趺。俗稱脚面。跗骨者。足趾本節。

出向後之骨首如張扇下寸許。附着於尻骨之上。形如馬蹄之處。名曰踝骨。下兩分出向前之骨。末如槌柱。在於髀內。名曰槌骨。與尻骨成鼎足之勢。爲坐之主骨也。婦人俗名交骨。其骨面名曰髓。俠髓之曰名曰機。又名脾樞。外接股之髀骨也。卽環跳穴處。此一骨五名也。股者。下身兩大支之通稱也。俗名大腿。小腿中節上下交接處。名曰膝。膝上之骨曰髀骨。股之大骨也。膝下之骨曰胫骨。脛之大骨也。髀骨者。膝上之大骨也。上端如杵。接於髀樞。下端如錐。接於胫骨。

圓二三寸許。兩旁四孔。下接尻骨上際也。脾者。腰下兩旁踝骨上之肉也。醫者。脾下尻旁大肉也。尻骨者。腰骨下十七椎。十八椎。十九椎。二十椎。二十一椎。五節之骨也。上四節紋之旁。左右各四孔。骨形內凹如瓦。長四五寸許。上寬下窄。末節更小。如人參蘆形。名尾間。一名氐端。一名楸骨。一名窮骨。在肛門後。其骨上外兩旁。形如馬蹄。附着兩踝骨上端。俗名髂骨。肛者。大腸下口也。下橫骨。踝骨槌骨者。下橫骨。在少腹下。其形如蓋。故名蓋骨也。其骨左右二大孔。上兩分。

處也。腦後骨者，俗呼腦杓。枕骨者，腦後骨之下，隴起者是也。其骨或稜或平或長或圓不一。完骨者，耳後之稜骨，名曰完骨。在枕骨下兩旁之稜骨也。頸項者，頸之莖也。又曰頸者，莖之側也。項者，莖之後也。俗名脖項。頸者，頭之莖骨。肩骨上際之骨，俗名天柱骨也。項骨者，頭後莖骨之上三節圓骨也。背者，後身大椎以下，腰以上之通稱也。膂者，夾脊骨兩旁肉也。脊骨者，脊骨也。俗名脊樑骨。腰骨者，卽脊骨十四椎下十五十六椎間尻上之骨也。其形中凹上寬下窄，方

節在掌。第三中指。名將指。三節在外。本節在掌。第四指。名無名指。又名小指。之次指。三節在外。本節在掌。第五指爲小指。三節在外。本節在掌。其節節交接處皆有碎骨筋膜聯絡。爪甲者。指之甲也。足趾同。岐骨者。凡骨之兩叉者。皆名岐骨。手足同。髑者。肩膊下內側對腋處。高起要白肉也。腋者。肩之下。脇之上。際俗名肱腋窩。脇肋者。腋下至肋骨盡處之統名也。曰肋者。脇之單條骨之謂。統脇肋之總。又名曰桴。季脇者。脇之下小肋骨也。俗名軟肋。眇者。脇下無肋骨空軟。

曰肱骨。肘下之骨曰臂骨。臂骨有正輔二骨。輔骨在上。短細偏外。正骨居下。長大偏內。俱下接腕骨也。腕者。臂掌骨接交處。以其宛屈故名也。當外側之骨名曰高骨。一名銳骨。亦名踝骨。掌者。手之衆指之本也。掌之衆骨名壅骨。合湊成掌。非塊然一骨也。魚者在掌外側之上。隴起。其形如魚。故謂之魚也。手者。上體所以持物也。手心者。卽掌之中也。手背者。手之表也。指骨者。手指之骨也。第一大指名巨指。在外二節。本節在掌。第二名食指。又名大指之次指。三節在外。本

也。舉丸者。男子前陰之兩丸也。上橫骨。在喉前宛宛中。天突穴之外。小灣橫骨。旁接拄骨之骨也。拄骨者。膺上缺盆之外。俗名顛子骨也。內接橫骨。外接肩解也。肩解者。肩端之骨節解處也。髑骨者。肩端之骨也。卽肩胛骨。頭曰之上。稜骨也。其曰接臚骨上端。俗曰肩頭。其外曲卷翅骨。肩後之稜骨也。其下稜骨。在背肉內。肩胛者。卽髑骨之末。成片骨也。亦名肩髑。俗名鋏板子骨。臂者。上身兩大支之通稱也。一名曰肱。俗名肱膊。肱膊中節。上下骨交接處。名曰肘。肘上之骨。

也。膺者。胸前兩旁高處也。一名曰臆。胸骨肉也。俗名
胸腔。鬲。鬲者。胸之衆骨名也。乳者。膺上突起兩肉有
頭。婦人以乳兒者也。鳩尾者。卽蔽心骨也。其質係脆
骨。在胸骨之下。岐骨之間。膈者。胸下腹上之界內之
膜也。俗名羅膈。腹者。膈之下。曰腹。俗名肚。臍之下。曰
少腹。亦名小腹。臍者。人之初生。胞帶之處也。毛際者。
小腹下橫骨間叢毛之際也。下橫骨。俗名蓋骨。纂者。
橫骨之下。兩股之前。相合共結之凹也。前後兩陰之
間。名下極穴。又名屏翳穴。會陰穴。卽男女陰氣之所

所生之骨也。俗名曰牙。有門牙。虎牙。槽牙。上下盡根牙之別。舌者。司味之竅也。舌本者。舌之根也。頑顙者。口內之上二孔。司分氣之竅也。懸雍垂者。張口視喉上。似乳頭之小舌。俗名確嘴。會厭者。覆喉管之上竅。似皮似膜。發聲則開。嚥食則閉。故爲聲音之戶也。咽者。飲食之路也。居喉之後。喉者。通聲息之路也。居咽之前。喉嚨者。喉也。肺之系也。噎者。咽也。胃之系也。結喉者。喉之管頭也。其人瘦者。多外見頸前。肥人則隱於肉內。多不見也。胸膈者。缺盆下腹之上。有骨之處。

生門牙之骨也。顴者。面兩旁高起之大骨也。顴者。俗呼爲腮。口旁顴前肉之空軟處也。耳者。司聽之竅也。蔽者。耳門也。耳郭者。耳輪也。顴耳前顴側面兩旁之稱也。曲顴者。顴之骨也。曲如環形。受顴車骨尾之鈎者也。顴車者。下牙床骨也。總載諸齒。能咀食物。故名。顴車人中者。鼻柱之下。脣之上。穴名水溝。口者。司言食之竅也。唇者。口端也。吻者。口之四周也。顴者。口角後顴之下也。顴者。口之下脣至末之處。俗名下把殼也。頤者。顴下結喉上兩側肉之空軟處也。齒者。口斷

上下兩目外衛之胞也。目綱者。卽上下目胞之兩臉邊。又名曰睫。司目之開闔也。目內眥者。乃近鼻之內眼角。以其大而圓。故又名大眥也。目外眥者。乃近鬢前之眼角也。以其小而尖。故稱曰銳眥也。目珠者。睛之俗名也。目系者。目睛入腦之系也。目眶骨者。目窠四圍之骨也。上曰眉棱骨。下卽頤骨。頤骨之外。卽顴骨。頤者。目下之眶骨。顴骨內。下連上牙床者也。顴者。鼻梁。卽山根也。鼻者。司臭之竅也。兩孔之界骨。名曰鼻柱。下至鼻盡之處。名曰準頭。頰者。頤內鼻旁間近

周身名位骨度註釋

頭者人之首也。凡物獨出之首皆名曰頭。腦者頭骨之髓也。俗名腦子。顛者頭頂也。顛頂之骨俗名天靈蓋。囟者顛前之頭骨也。小兒初生未闔名曰囟門。已闔名曰囟骨。卽天靈蓋後合之骨。面者凡前曰面。凡後曰背。居頭之前故曰面也。顏者眉目間名也。額顛額前髮際之下。兩眉之上名曰額。一曰顛者亦額之謂也。頭角額兩旁棱處之骨也。髮骨卽兩太陽之骨也。目者司視之竅也。目胞者一名曰窠。一名目裹。卽

抱膝


抱膝者用絲弦簾作圈較膝蓋骨稍大些以布條纏於圈上作四足之形箍於膝上

用法詳於第二十二則內

抱膝用法圖



抱膝圖



後於每根兩頭各鑽一孔以繩聯貫之有似於籬故名焉裹於杉板之外取其堅勁不致斷骨之走動耳

木板

木板者用極薄之杉木板如有糕匣木板者更妙用法先以白布條纏於傷處至二三重後將板四圍覆上又將布纏之外再用杉籬裹於外也

其用詳於第十六則內



杉籬

杉籬者複逼之器也量患處之長短濶狹曲直凸凹之形以杉木爲之酌其根數記清次序不得紊亂然

木 板 杉 籬 用 法 圖



圖籬杉 圖板木



南翔石夏珍刻

腰柱

腰柱者以杉木四根製如扁擔形寬一寸厚五分長短以患處爲度俱自側面鑽孔以繩聯貫之


用法釋義

凡腰間閃挫結氣者以常法治之若腰節骨被傷錯筍脊肉破裂筋斜偃僂者用醋調定痛散敷於腰柱上視患處將柱排列於脊骨兩旁務令端正再用蘄艾做成薄褥覆於柱上以御風寒用寬長布帶繞向腹前緊緊紫裹內服藥餌調治自愈

腰柱用法圖



腰柱圖



攀索

攀索者以繩掛於高處用手攀之也

疊甃

疊甃者以磚六塊分左右各疊置三塊兩足踏於其上
上也

用法詳於第十五則內

攀 索 疊 軋 用 法 圖



項頸骨五節

琵琶骨亦名髀骨

龍骨

脊骨七節

右耳根

額角後

後腦

額角後

左耳根

乘枕
乘枕

琵琶骨

右臂下俱根前

左臂下俱根前

肋骨即釵骨左
右共三齒條

脊骨六節

方骨

右腿骨下俱根前

左膀後

右膀後

尾蛆骨

左腿骨下俱根前


腰間骨五節

足外踝

足外踝

足外踝

足外踝



命^不勝骨後^左右

命^不尾蛆骨男子九竅婦人六竅

命致
項頸骨第一節

命致不
第二節

命致不
第三節

命致不
第四節

命致不
第五節

命致不
琵琶骨亦毛脾骨

命致
脊背骨第一節

命致不
二節兩旁橫出者髑骨

命致不
第三節

命致不
第四節

命致不
第五節

命致不
第六節

命致
脊背骨第一節

命致不
第二節

命致不
第三節

命致不
第四節

命致不
第五節

命致不
第六節

命致不
第七節

命致不
兩肋骨共二十四條卽釵骨婦人多四條

命致
腰眼骨第一節

命致不
第二節

命致不
第三節

命致不
第四節

命致不
第五節

命致
方骨

命致不兩胎膊骨左

命致不兩髀骨左
婦人無

命致不兩腕骨左

命致不兩膝骨左

命致不兩脛骨左

命致不兩肢骨左

命致不兩脚跟骨左
右

一合面

命致腦後骨

命致不兩肘骨左

命致不兩手踝左

命致不兩手掌骨左
十塊

命致不兩腿骨左

命致不兩脛骨左
婦人無

命致不兩足掌骨左
十塊

命致不兩臂骨

命致不兩手外踝左

命致不兩手指骨左
十八節

命致不兩膝蓋骨左

命致不兩足外踝左

命致不十趾左
共三十六節

命致乘枕骨左
婦人無

命致兩耳根骨左

照檢骨格圖

一仰面

致命頂心

致命顙門骨

致命額顙骨

致命兩太陽穴左右

致命兩眉稜骨左右

致命兩眼眶骨左右

致命鼻梁骨

致命兩顴骨

致命兩頤頰骨左右

致命口骨上下

致命齒上下

致命頷頰骨

致命頰車骨左右

致命兩耳竅左右

致命嚙喉骨其屬喉嚨骨
只亦屬不可檢

致命龜子骨即胸前骨
係連脊

致命心坎骨

致命兩肩井臆骨左右

致命兩血盆骨左右

致命兩橫髑骨左右

致命兩飯匙骨左右

易斗甫要
骨格



修和補要

卷一

兩後脇右左 腰眼右左

一合面不致命

髮際 項頸 兩臂膊右左 兩肱肘右左

兩手腕右左 兩手背右左 十指右左 十脂甲右左

兩後肋右左 兩鬢右左 穀道 兩腿右左

兩曲腓右左 兩腿肚右左 兩腳踝右左 兩腳根右左

兩腳心右左 十趾右左 十趾肚右左 十趾甲右左

十趾甲縫右左

鼻梁

鼻竅

人中 上下唇吻

上牙齒

頷頰

食氣嚙 兩血盆骨

兩肩甲

兩腋臑

兩胎膊 兩曲肱

兩手腕

兩手

兩手心 十指

十指甲縫

兩肋

兩膀 莖物

兩腿

兩膝

兩廉脇 兩腳腕

兩脚面

十趾

十趾甲

一合而致命處

腦後

兩耳根

脊背 脊膂

照洗冤錄屍格圖

一仰面致命共十六處

頂心

偏左

偏右

顙門

額顙

額角

兩太陽穴左右

兩耳竅左右

咽喉

胸膛

兩乳左右

心坎

肚腹

兩脇

臍肚

腎囊婦人產門
女子陰戶

一仰面不致命

兩睂

左右

睂叢

左右

兩眼胞

左右

兩眼睛

左右

兩腮頰

左右

兩耳

左右

兩耳輪

左右

兩耳垂

左右

應刺之法詳於第三十六則內

應刺穴圖



關元

衝陽

然谷前

大敦

南翔石夏珍刻

者凡兩踝前後脛掌所
交之處皆爲跗之屬也

跗屬以下至地長三寸

外踝以下至地長一寸

足長一尺二寸廣四寸半

按

骨度乃靈樞經骨度篇之文論骨之長短皆古
數也然骨之大者則太過小者則不及此亦言
其則耳若周身手足折量之法用前中指同身
寸法爲是同身寸量法詳刺灸書中

內輔下廉下至內踝長一尺二寸

內踝以下至地長三寸

四肢部

肩至肘長一尺七寸

肘至腕長一尺二寸半

臂之中節曰肘

腕至中指本節長四寸

臂掌之交曰腕

本節至末長四寸半

指之後節曰本節

膝以下至外踝長一尺六寸

膝以下至跗屬長一尺二寸

腿灣也跗足面也膝在前跗在後跗屬

側部

自柱骨下行腋中不見者長四寸

柱骨頸項根骨也

腋以下至季脇長一尺二寸

季脇小肋也

季脇以下至脾樞長六寸

大腿曰股股上曰髀髀骨之下大腿之上兩骨合縫

之所曰髀樞當足少陽環跳穴處也

髀樞下至膝中長一尺九寸

橫骨上廉下至內輔之上廉長一尺八寸

骨際曰廉膝旁之骨

突出者曰輔骨內曰內輔外曰外輔

內輔之上廉以下至下廉長三寸半

上廉下廉可摸而得

按

背部折法自大椎至尾骶通折三尺上七節各長一寸四分一厘共九寸八分七厘中七節各一寸六分一厘共一尺一寸二分七厘第十四節與臍相平下七節各一寸二分六厘共八寸八分二厘共二尺九寸九分六厘不足四厘者有零未盡也直寸依此橫寸用中指同身寸法脊骨內濶一寸凡云第二行俠脊一寸半三行俠脊三寸者皆除脊一寸外淨以寸半三寸論故在二行當爲二寸在三行當爲三寸半也

按胸腹折法直寸以中行爲之自缺盆中天突穴起至岐骨際上中庭穴止折作八寸四分自臑鬲上岐骨際下至臍心折作八寸臍心下至毛際曲骨穴折作五寸橫寸以兩乳相去折作八寸胸腹橫直寸法并依此

背部

脊骨以下至尾骶二十一節長三尺脊骨脊骨也脊骨外小而內巨

人之所以能負任者以是骨之巨也脊骨二十四節今云二十一節者除項骨三節不在內也

腰圍四尺二寸

缺盆以下髑髀之中長九寸

胸圍四尺五寸

兩乳之間廣九寸半當折八寸為當

髑髀中下至天樞長八寸天樞足陽明穴名在臍旁此指平臍而言

天樞以下至橫骨長六寸半橫骨橫長六寸半
毛際下骨

曰橫骨

按此古數以今用上下穴法參較多有未合宜從

後胸腹折為當

兩脾之間廣六寸半此當兩股之中橫骨兩頭之處俗名髀縫

靈樞經骨度尺寸

頭部

項髮以下至脊骨長二寸半

自後髮際以至大椎頂骨三節處也

按

頭部折法以前髮際至後髮際折爲一尺二寸

如髮際不明則取眉心直上後至大杼骨折作一尺八寸此爲直寸橫寸法以眼內角至外角此爲一寸頭部橫直寸法並依此

胸腹部


結喉以下至缺盆中長四寸

此以巨骨上陷中而言卽天突空處

骨 度 背 面 尺 寸 圖



骨 度 正 回 尺 寸 圖




骨度側面全圖



骨度背面全圖



骨度正面全圖



人身側面穴圖



人身背面穴圖



人身正面穴圖



一

一

一

一

一

一

一

一

器具總論

跌撲損傷雖用手法調治恐未盡得其宜以致有治如未治之苦則未可云醫理之周詳也爰因身體上下正側之象製器以正之用輔手法之所不逮以冀分者復合欹者復正高者就其平陷者升其位則危證可轉於安重傷可就於輕再施以藥餌之功更示以調養之善則正骨之道全矣

膠柱圖

杉板圖

杉籬圖

抱膝圖

周身名位骨度註釋

傷科脉訣

骨度側面全圖

骨度正面尺寸圖

骨度背面尺寸圖

靈樞經骨度尺寸部

應刺穴圖

照洗冤錄屍格圖

照檢骨格圖

器具總論

攀索登磚圖

傷科補要卷一

上海錢秀昌松溪氏編輯

男 丹書杏園

同較

婿何錦華鶴汀

卷一 目次

人身正面穴圖

人身背面穴圖

人身側面穴圖

骨度正面全圖

骨度背面全圖

卷三

治傷湯頭歌括

卷四

附錄總方

又附急救良方

傷科補要卷一

總目

卷

人圖穴部

器具圖法

周身名位骨度註釋

傷科脈訣

卷二

治三十六則

叅訂門人

陸雨田蒼虬

寶山

戴御天雲樵

上海

王沛寰雲舟

上海

殷維三藹堂

上海

羅星海琴圃

南滙

趙東序省菴

南滙

戴上珍秋橋

上海

一又附急救良方以便一時之取用并廣學者之心
胸可行方便

傳分爲條則使學者熟讀可括症治諸法之要
凡三十六則內應用諸方俱以經驗奈其湯液藥
名總衆記憶良難渾括爲歌易于成誦臨用時某
症某方某藥燎然心目如其藥味加減分兩多寡
全在醫者隨症之輕重酌量可也

一所編歌括其中平仄韵脚不叶者因限其湯名藥
名難以更易也

一末附諸方抄集傷科各家之秘雖未經試驗不敢
擅刪以備明眼之採擇

臨症時雖於肉裏能洞悉其形狀學者能再於骷
髏上細細辨別更詳

一治傷制器具以輔手法之成功應用之器具亦繪
圖形使學者依樣立法

一週身名位骨圖甚多恐難熟記故錄其註釋會集
一篇學者誦而熟之則了然心目矣

一治傷須明其脈理與症合參庶不誤耳茲叙其畧
若要精微須詳脈訣

一三十六則參正骨心法之精義合平日試驗之真

凡例

一凡治傷先須認明穴部若穴不明治則有悞故繪
總穴人圖及靈樞經骨度全圖以便學者參考
一人身骨部長短有尺寸故抄靈樞經骨度繪出以
便刺繆用法中指同身寸爲准

人之穴部總多一穴有幾名之呼難以辨別故照
洗冤錄人圖繪閱有致命不致命處易於分別

一凡人之脫骺斷骨其骨骺包於肉裏外視難明恐
有差悞故照骨圖繪明可辨其骺之形其骨之狀

制器拙者之利也其裨益後學功
用何如豈盜名欺世荒誕不經者所
可同日語哉

嘉慶壬申春三月

賜進士出身前任廣西知平南縣
亭山左張範東撰




並觀古人傷科諸書或紛繁滋惑
或簡略不詳及洵是編分門別類辨
識精明且更繪象考形俾穴部骨
度毫厘不爽讀是編者可以不煩
思索而瞭如指掌誠不愧濟世之仁心
所謂居者治道行者之資也巧者

毆傷身命懸呼吸欲求一良醫挽救
不可得目擊情形使我心惻恒嘆扁
鵲華佗之屬不再見也辛未春因
訪同年王交峰大尹來申江聞有松
溪錢君者精治傷科輯而成編持
危扶顛名噪一時予雖未諳醫理

嘉慶癸酉夏日

唐子科舉人現任福建知崇安縣事
練水朱茂常撰



目有光明乞命者美無夭折謂非仁人
之言矣利溥耶更問松溪應人所求即
貧賤不能自存者必拯其危急惟以後
是以儒者之道行濟者之術其實行也
非特善著書而已予愛之重之言之
不足因濡毫而為之序

同大抵失其調養所致醫者按脉切
究審病施方不難次第奏功至傷科
一門非諸疾可比譬如操舟行江河
輒遇風濤開頭換舵存亡看睫之間
使不能急為轉移烏足云行其仁術
也予向出宰粵西時偶值民間鬥

觀夫天地之生人也。死生壽夭至無定

矣。子無定而寓有定者。莫若醫。醫與方醫

者。意也。方者法也。能神明其意於法

之中。則死者生。夭者壽。所以立生人

之命。即所以補天地之憾。醫者之為用大

矣哉。顧人身受病風寒暑濕各有不

也為惻然者以之今歲春仲弟白陔來
署中手携松溪錢先生傷科補要
示予予喜欽松溪人品進清莊讀一過
覺學綜百代識曠千秋約而該奇而
法沿流討源俾觀者有徑可尋及門而
入爰付同人廣為傳布今白陔司命者

仁術況傷科一門生死之關轉移瞬息
更非諸疾可比者哉予雖不學醫而好
觀內經難經脈經等書比以云宰閱
中參觀不暇邑民多強梗逞其囂
勇鬥毆身傷命歟呼吸求醫固不良
不可挽救所誤一朝乙念忘身及親者

漢唐宋明剗剗充棟其間引而未發
之旨舛而承訛之弊莫可枚舉讀
前人之書而不察前人之意不足以
言得案前人之意而不正前人之誤
亦不足以言醫且即博學明辨而非運
以靈心充以活法不能次第奏功行其

序

儒之道無所不通醫之道一伎術而
近於儒者少也蓋儒之道仁而已仁
者無不愛先弱之急惟親與身愛
親占身而歆其壽且康此醫孰能
使之顧醫之道蹟矣上自炎皇下逮

乎吾願而書之傳而祝而術
之無傳也

嘉慶己巳季春知上海縣事
長白山人鐵菴蘇昌阿撰



術在傷科與爲之穆然而思
然而忘親而閭狠者民風之
悍也馴悍而化之者有司之
責也彼儲玉札牛溲而察蚺
者吾見其書而求其人傷科

吾聞古醫者解顱理腦破腹
瀦腸後立不可復得而余親
見折足者醫斷其骨而齊之
中接以楊木卧百日耳步履不
爽其恒豈古醫之奇者其遺

而無非所謂得其要也肱三
折而後醫良蓋歷而試也非
歷而有所親得何能創說以
補古之所缺補而能要余尤
善之故欣然濡筆而爲之序

讀之者非貫滙諸家參互其
義而擇之精辨之詳鮮不失
焉今傷科書不多見是書傳
而世得其濟也得無轉勝於
多書者與獨著而刪煩有是

謀之誤之也習焉而不極者
多師之禁之也內科之書解
古說而如聚訟矣主其所見
矜其所得而執偏矣似是而
非熒學者之心目而惑之矣

嘗亦思得其書以傳其精詣
之微妙上海精是者曰錢生
呈其書曰傷科補要余讀而
善之又以傷科書僅見而珍
之也嗟乎築室而不成者道

剗毆者抵法孤其子寡其婦
兩家均焉幸而得全則兩家
賴焉當是時兩家之命懸於
醫或淺深重輕失其情投藥
違節醫之不良莫可挽救故

見其以是與余司民社有年
矣民健聞而訟聞而死者在
在有之每見垂斃人舁卧堦
下血糲糊氣息纔屬輒惻然
不忍亟視急呼醫蓋傷者死

誤著書者推闡精蘊各名其
家故其書層出而不窮發為
癰瘍者次之若傷也者由外
至其深淺重輕可按視而得
也為術或稍易焉書之不多

外科之書亦夥若所謂傷科
之書則不少槩見且夫疾之
伏於內者淺延腠理深居膏
肓其患岐而理微醫之良者
視色視毫毛其術難而施易

序


良醫出而不患夭札醫書成
而可綿心傳病者賴醫而醫
者賴書以精其業術書詎不
重矣哉內科之書汗牛充棟

嘉慶戊寅春鐫

上海錢秀日昌著

傷科補要

虹口竹蔭堂藏板



Amey

W/B

700

C5335

1818

pt. 1



+55151

Beginning of Part 1

**End of
Part 2**

FRENCH BOOKSTORE

PEIPING (CHINA)

北平法文圖書館



必有擊墮之事。因脬肉無破。則惡血必留脅下。兼致
嘔逆。依經鍼刺。然谷足跗。或三毛等穴出血。或飲利
藥。使惡血開行。當自愈也。若脈浮微而濇。當知亡血
過多。依經於三結交關元穴灸之。或飲大補氣血之
劑而調之。則病已矣。

在內傷痛未已可側刺不可遠取也。

靈樞經邪氣

臟腑病形篇曰有所墜墜惡血在內有所大怒氣上

而不下積於脇下則傷肝法當先瀉怒氣勿積於肝

則肝可以無傷然後飲以利藥以破惡血則脇下無

留血矣又曰有所擊朴若醉入房汗出當風則傷脾

素問脉要精微論曰肝脉搏堅而長色不青當病

墜若因血在脇下令人喘逆金匱要畧曰寸口脉

浮微而濇然當亡血若汗出設不汗出者其身有瘡

被刀斧所傷亡血故也又論曰肝脉搏堅而色不變

第三十六則 應刺諸穴

素問繆刺論曰。人有所墮墜。惡血留內。腹中滿脹。不得前後。先飲利藥。此上傷厥陰之脈。下傷少陰之絡。刺足內踝下。然谷之前。血脈出血。刺足跗上動脈。不已。刺三毛各一病。見血立已。左刺右。右刺左。靈樞經寒熱病論篇曰。身有所傷。血出多及中風寒。若有所墮墜。四支懈惰。不收。名曰體惰。取其小腹臍下三結交三結交者。陽明太陰也。臍下三寸關元也。靈樞經厥病論曰。頭痛不可取於膺者。有所擊墮。惡血

將飛鹽蓋臍上。如銅錢厚薄。鹽上用艾火灸二三壯。卽通。去射可也。化痞熨法。凡人蓄血成痞。或在脇內。或在腹中。服藥難消。用飛麵量痞之大小。四圍作圈。使惡物無從逃避。圈內置朴硝滿。圈恐其側邊卸落。以脚條縛之。又襯紙二三十重。將熨斗盛火熨之。俟患處有响聲。乃痞消之驗。斯運燠灸倒之法。恐患人不善服藥。不得已而用之。亦不可輕使。若元氣虛弱。人用之太過。必致氣促厥逆之虞。醫者慎之。

將單被蓋身其汗立至不可閃開恐汗卽止病根不
清也。灸法或瘀血在骨節中恐其發毒先服瓜皮
散用生炭燒紅地皮社醋烹之再將稻草攤上單被
爲蓆使患人卧上厚被蓋暖使其汗出如雨服勝金
散而安若氣虛之體不可用此。凡倒法病人不能
言不能食無法可治不得已要使惡物吐之先服硫
射散將患人卧被上每邊兩人牽被倒動使人滾轉
反側吐出惡物服蠱重散再調理可愈。灸臍法若
膀胱傷小便秘結可用田螺射香搗爛先置臍中再

第三十五則

運燠灸倒四法及
灸臍化痞法附

外用運燠灸倒四法。宿傷可用。新傷不可用。新傷者。血未歸經。恐其瘀血攻心之患也。運法。凡最輕之傷。先用瓜皮散。次用麥麴一升。胡葱一把。酒藥十丸。醋炒香附一升。同入鍋內炒熟。以社醋烹之。蓋片時。乘熱布包。運動患處。冷卽換易。待其患處汗出如油。可也。燠法。凡宿傷在皮裏膜外。雖服行藥。不能除根。服瓜皮散。次用落得打草。陳小麥艾葉三味。用河水共煎一鍋滾透。入小口缸內。橫板一塊。患人坐板上。再

丸灌之如無牛以有力之人躬腰將溺人如前覆人背上微微動搖水亦可出或川鍋覆於地上將溺人腹覆於鍋底亦可如冬月急將濕衣解脫更乾衣用鹽炒熱布包熨臍或將被褥鋪地用灶內熱灰鋪於褥上將溺人覆臥其肚下墊綿枕一個再將熱灰渾身蓋之再用綿被蓋之不可使灰迷其眼口使其出水甦醒後宜服姜湯熱酒按灰性最能拔水若救起時尙有微氣胸前溫煖令速脫濕衣換乾服屈其兩足擔人肩上將溺人背貼於人背擔走吐水卽活

此法無不活者。卽身雖僵冷。亦可救也。

第三十四則 救溺水

凡人溺水者。撈起之時。急撬開其口。橫啣竹筍一隻。使可出水。將通關散吹其鼻內。或生半夏末亦可。再用筆管吹兩耳。又將皂角末置管中吹其穀道。如夏月將溺人腹橫覆牛背上。兩邊使人扶住。牽牛緩緩行動。腹中之水從口并大便流出。將生姜湯化蘇合

第三十三則 救自縊法

凡自縊者不可割斷其繩一人抱起解結放下置平坦處仰臥一人坐於頭前將兩腳踏其肩。上揪住其髮要用力拔緊。不可使其頭垂下。一人用二指捏正其喉腕。凡縊則喉腕必扁。故氣不得通耳。所以先正其腕。後吹通。關散於兩鼻孔內得嚏則生。二人用蘆管吹其兩耳。不可住口。再得一人以手撫摸其胸腹。二人將其手足屈伸活動。待一個時辰呼吸之氣出入。其人必甦。卽磨再造紫金丹灌其口內服之。若依

第三十二則

湯火傷

凡湯火傷人。最忌浸冷水中。恐防火毒攻心。有立斃之禍。亦不宜服冷食寒涼之物。急服護心丹。或服童便。護其心。使火毒不內攻。外用無灰酒洗淨。拔其火毒。用黃連末。桐油調敷。或猪毛煨存性。研末。加輕粉。礪砂。麻油調敷。或鷄子清調。大黃末敷之。或蚌粉摻之內服。玄妙散解毒可也。若花砲火藥烘燎者。治法相同。

合而愈。蜈蚣咬傷者。卽取雄雞。倒掛少時。以手指蘸口內雞涎。抹搽傷處。其痛立止。甚者生雞血。乘熱飲之。立效。蠍螫傷。取大蝸牛一個。搗爛塗之。其痛立止。一時不得蝸牛。卽螫處擠去毒水。急用膏藥烘熱貼之。亦止。

之見效。有馬咬傷者。粟子嚼爛敷之。毒氣入裏心。
煩嘔悶者。用馬齒莧搗爛敷之。如潰爛者。照前法治。
之。熊虎狼牙爪傷人皮肉成瘡者。初宜葛根濃煎。
內服三鍾。外洗十數度。或煮生鐵有味洗之。又用青
布急捲爲繩。燃着納竹筒中。注瘡口薰之。出毒水次。
宜獨窠栗子生嚼塗瘡口。効。蛇咬傷者。卽時飲好
醋一二碗。使氣不隨血走。以繩紮傷處兩頭。若昏昏
困倦。宜用五靈脂五錢。雄黃二錢五分。共爲末。酒調
服。少時咬處出黃水。水盡則腫消。以雄黃末搽之。口

有紅髮一根速當拔去。又法用荳豉研末香油調服。
丸如彈子大常揩拭所咬處。搗開看鼓丸內若有狗
毛茸茸然此係毒氣已出。易丸再揩至無茸毛方止。
甚効。始終禁忌必當慎重。終身忌食狗肉蠶蛹赤荳。
百日內忌見麻物。忌飲酒。三年內忌食一切毒物及
房事。可常食杏仁以防其毒。若治遲犬毒入心煩亂
腹脹口吐白沫者用虎頭骨虎牙虎脰骨爲末酒調
二錢服之。若發狂呌喚人聲似虎聲。眼神露白者逆
終始犯禁忌者不救。若有貓咬傷者用薄荷汁塗。

蓋玉紅膏收功。瘋犬咬傷。犬因五臟受毒而成瘋。犬故經其齧。必致傷人。九死一生之證也。初被咬時。急就咬處。刺出毒血。以口含漿水。吮洗傷處。或以拔法。拔之。或以人尿淋洗。拭乾。卽以核桃半邊之殼。以人糞填滿。罨在患處。上着艾火灸之。殼焦糞乾。再易。灸至百壯。以玉真散吐津調敷。次日再灸。漸灸至三百壯。爲度。於初灸時。卽服扶危散。逐惡物血片。從小便中出。若毒物血片。填塞莖中。致小水澀滯。痛而如淋者。卽服琥珀碧玉散。以通利之。被咬之人。傾心。

第三十一則 諸咬傷

凡被人咬傷。或臂或指。痛不可忍。若久則爛脫指節。或病人咬者。毒氣攻心而死。先投護心丹。外治用熱尿洗去牙黃瘀毒。以蟾酥丸塗孔中。或嚼生白果塗之。如痛極。用蘇油紙燃火焰薰之。或急用人尿入瓶內。將手指浸之一夕。貼玉紅膏可愈。凡犬咬傷者。初咬之時。須忍痛。以河水捏淨血水爲主。用生虎骨刮末。擦咬處可愈。或刮肉店墩板上油膩。拌砂糖敷之亦可。若潰爛流膿。用木螯子煎湯洗淨。搽生肌散。

若箭頭入骨。不可拔者。用螻蛄乳香等分。射香少許。爲末敷上。微痒可拔。或螻蛄巴豆敷之。候極痒。可以拔出。人尿洗之。或黃連管仲湯洗之。敷花蘆石散貼。陀僧膏。又有鐵珠入肉。敷碣鉄散。或割開皮。用筆管撲之。撲則珠入管內而出。又有鉛彈入肉。以水銀灌入傷處。其鉛卽化。隨水銀而出。用麻油洗淨。蓋玉紅膏收功。

第三十則 藥箭傷

有交廣蠻夷。用焦銅作箭鏃甚毒。人若中之。纔傷皮肉。便悶膿沸爛而死。急飲金汁。外亦金汁抹之。若金汁一時不得。卽灌人糞汁。竝外敷之。非此不能解毒也。又一種毒藥。喂箭。名爲射齒。人若中之。甚毒。急用葛氏方。用藍靛汁一椀。飲之外。亦用塗抹傷處。一法用大豆猪羊血。內服外敷。解毒亦效。又法須防毒氣攻心。急投護心丹。傷口卽將麻油灌之。用黃連管仲煎湯洗去毒氣。敷花藥石散。又蓋玉紅膏。防護風邪。

生肌散蓋玉紅膏逐日洗換服理氣養營之劑調治
凡人受夾棍之後一出衙門卽用熱童便一盆將足
浸之如便冷燒紅磚二塊焯之卽熱浸至童便面上
浮起白油面者其傷始出後不潰爛再用肥皂搗如
泥入鷄子清和勻塗患處紫緊一夜或用何首烏搗
罨亦可內服逐瘀定痛散另服定痛活血湯倘損斷
骨再投接骨紫金丹可無患矣

第二十九則 杖瘡夾棍傷

凡人受杖後腿必蓄瘀紫黑甚則氣瘀攻心而死。速服護心丸或以酒冲童便服之亦可。外用熱荳腐塗於患上其氣如蒸其腐卽紫再易色淡以此爲度。或用葱熨法熨散其瘀亦可。或用鳳仙花連根葉搗爛塗之乾則易換。或用真綠荳粉微炒鷄子清調敷。或用白蘿蔔搗爛罨之。或用大黃末童便調塗。又法用銀針刺去其毒血敷生肌散。蓋玉紅膏內服化瘀散。若杖後隔四五日腫痛潰爛流膿用甘葱煎洗淨。摻

陽氣虛寒也。用參附湯。若吐瀉手足俱冷。指甲青黑。脾腎虛寒甚也。急用大劑參附湯。口噤手撒。遺尿痰盛。唇青體冷者。虛極壞症也。大劑參附湯。以圖僥倖。或少腹引陰莖作痛者。乃瘀血不行。肝經火鬱所致。用小柴胡湯。加大黃黃連山梔。待其痛勢已定。再宜養血。若誤認寒症。投以熱藥。重則必危。輕則損目。若腰痛脊痛。因瘀血留太陽經所致。服地龍散治之。

第二十八則 腹痛腰痛

傷損腹痛。大便不通。按之痛甚。瘀血內蓄。用加味承氣湯。既下而痛不止。按之仍痛者。瘀未盡也。用加味四物湯。補而行之。若腹痛按之不痛者。血氣傷也。四物湯加參、耆、白朮。補而和之。下而胸脇反痛。肝血傷也。用四君湯加芍、歸。既下發熱。陰血傷也。四物湯加參、朮。下後惡寒發熱者。氣血傷也。八珍湯。下後嘔吐者。胃氣傷也。六君子湯。加當歸。下後泄瀉不止者。六君子湯。加肉果。補骨脂。下後手足俱冷。背汗出者。

傷寒本要卷二
三
痛大便不通喘咳吐血者乃血瘀停滯用當歸導滯
散內經云肝藏血脾統血蓋肝屬木木勝侮土脾氣
必虛宜清肝養血次壯脾胃則氣血充盛若妄行剋
伐虛者益虛滯者益滯禍不旋踵矣

第二十七則 胸腹脇肋痛悶

傷損之症。胸腹痛悶。因跳躍。挺胸。悶挫。舉重。勞慾。恚怒所致。喜手摸者。肝火傷脾。用四君子湯。加柴胡。山梔。如畏摸者。肝經血滯也。用四物湯。柴胡。山梔。桃仁。紅花。若胸脇悶痛。日晡發熱。肝經傷也。用加味逍遙散。若胸腹悶痛。飲食少思。肝脾氣俱傷也。用四君子湯。加芎歸。柴梔。丹皮。若胸腹不利。食少無寐。脾氣鬱結也。用加味歸脾湯。若脇肋脹痛。大便通和。喘咳吐痰。肝火侮肺也。用小柴胡湯。加青皮。山梔。若胸腹脹

從嘔而出。形實者。用百合散。形虛者。加味芎歸湯。或
出血過多。脉洪大而虛。重按全無。血虛發熱。用當歸
補血湯。脉細沉微。按之輕弱。此陰盛發熱。四君子湯
加薑附。或筋惕肉瞤。此亡血也。用聖愈湯。發熱汗出
不止者。血脫也。用獨參湯。凡血脫之症。脉實者難治。
脉虛者可療也。

第二十六則 損傷出血吐血

傷損之症或患處或諸竅出血者此肝火熾盛血熱錯經妄行也用加味逍遙散中氣虛弱血無所附而妄行加味四君子湯中氣下陷補中益氣湯元氣內脫用獨參湯加炮薑附子血蘊於內而嘔血者四物湯加柴芩煩勞太過或惱怒氣逆或過服寒毒等藥致傷陽絡則吐血衄血便血傷陰絡則血積血塊肌肉青黑臟腑虧損經隧失職急補脾肺二臟自愈或嘔吐黑血者因打撲傷損敗血流入胃腕色如豆汁

放痧穴道歌

歌

放痧有的穴

百會印堂尋

兩太陽當刺

喉旁雙下針

舌根旁點破

兩乳必須針

十指尖頭放

曲脈左右分

趾頭雙足取

曰

腿灣刺青筋

忌服姜湯酒

還須治絕根

第二十五則 受傷感痧論

凡受不甚重傷。越四五日。腹中絞痛。胸悶嘔惡。或四肢麻木。或骨節疼痛。脈象或浮或伏。與症不合。指甲紫。兩腿灣有青筋。必是痧穢之毒。宜刮宜放。宜先服散痧之藥。不可服傷藥。與姜酒熱湯等物。若犯之。則禍不旋踵矣。治法。吹人馬平安散。吃蟾酥丸。又服再造紫金丹。俟痧退後。再投祛瘀生新之藥。始無妨碍。又有傷症兼疫症者。先治其疫。而後治傷。庶可兩痊。予臨症時。常遇之。故特補出。

第二十四則 受傷着寒及懷孕而傷

凡人跌撲。鬪毆。內傷其血。復輕生投水。外着於寒。血得寒而凝結。寒得血而入深。未有能生者也。治法先祛其寒。繼逐其瘀。祛寒用麻桂溫經湯。逐瘀投紫金丹。若遲延日久。則氣滯血凝。筋脉拘緊。手足攣拳。必致不治。急服大神效活絡丹。冀其漸漸疏通。或可挽回。若婦人懷孕受傷。不可妄投傷藥。恐損胎元。反爲不美。宜服安胎和氣飲。稍加祛瘀生新之劑。使氣血和而痛自止矣。

服健步虎潛丸。稍愈後若遽行勞動。致斷骨之端復走向裏歪者。則內踝突出腫大。向外歪者。則外踝突出腫大。瘀聚凝結。步履無力。頗費調治。必待氣血通暢始可行動。若腳趾斷失。與手指同法治之。跗者。足背也。一名足跌。俗稱脚面。其骨乃足趾本節之骨也。其受傷不一。輕者僅傷筋肉。易治。重則骨縫參差。難治。先以手輕輕搓摩。令其骨合筋舒。洗入仙逍遙湯。貼萬靈膏。內服健步虎潛丸。及補筋丸可也。

第二十三則

胛骨脚踝跗骨

胛骨。卽膝下踝上下腿骨也。俗名膝脛骨。其形二根。在前名成骨。其形粗。在後名輔骨。其形細。俗名勞堂骨。下至踝骨。胛骨之下。足跗之上。兩旁突出之高骨也。在內名內踝。俗名合骨。在外爲外踝。俗名核骨。其骹出者。一手擡住其脚踝骨。一手扳住脚後根。拔直撥筋正骨。令其復位。其骹有聲。轉動如故。再用布帶縛之。木板夾定。服舒筋活血湯。一二日後。解開視之。倘有未平。再用手法按摩其筋結之處。必令端直。再

內筋腫脹。向內側者。則筋直。腫脹。須詳視其骨如何。
斜錯。按法推拿。以復其位。服補筋湯。其骹出者。一手
按住其膝。一手挽住其膀。上下拔直。將膝曲轉。抵着
豚引。其骹有聲者。上也。服生血補髓湯。若膝蓋骨破。
兩引者。用絲弦。簾作箍。布條縛之。生線四根。如抱膝。
圖法。將手擠圓。箍定其骨。膀下縛住。屈臥。月餘。服接
骨紫金丹。若箍後。仍兩引。一生跛足。不可治矣。

第二十二則 大捷骨膝蓋骨

大捷骨名髀骨。上端如杵。入於髀樞之曰。下端如鎚。接於髀骨。統名曰股。乃下身兩大支之通稱也。俗名大腿骨。其下有膝蓋骨。卽連骸。又名臄骨。形圓而扁。覆於捷桁上下兩骨之端。本活動物也。內面之筋。上過大腿至兩脇。下過髀骨至足背。內經曰。膝乃筋之府。若傷之上。連腰屈疼痛。下移胙骨。焮腫。或足腹冷硬。步履斜行。或膀子重傷。後成黃病。服紫金丹。再茵陳等湯。治黃病之藥。收功。若膝蓋離位。向外側者。則

住其身一人捏膝上拔下一手擎其骹頭迭進一手將大膀曲轉使膝近其腹再令舒直其骹有响聲者已上再將所翻之筋向前歸之服生血補髓湯再服加味健步虎潛丸若骹不上則驚努斜行終身之患也慎之。

正屈伸活動服和營止痛湯其法相同不必逐節論也。

第二十一則 醫髌骨

勝骨卽髓骨也。又名髌骨。其外向之凹其形似口以納髌骨之上端如杵者也。名曰機。又名髌樞。卽環跳穴處也。俗呼醫髌。若出之則難上。因其勝大肉厚。下正不佳故也。必得力大者三四人。使患側卧。一人抱

第二十則 手腕

腕骨卽掌骨乃五指之本節也。俗名虎骨。其大小六枚。湊以成掌。非塊然一骨也。其並接臂輔兩骨之端。其外側高骨。俗名龍骨。能宛屈上下。故名腕。若手掌著地。只能傷腕。若手指着地。其指翻貼於臂者。腕縫必開。壅腫疼痛。先兩手揉摩其腕。一手按住其骹。一手拔其指掌。掬轉有聲。活動其骹。復位。仍按摩其筋。必令調順。然命脉之所。服寬筋散。須防着寒。得免酸疼之患。凡人手指有三節。其骹突出者。俱可拔直。捏

第十九則 曲脈

肘骨者。肱膊中節。上下支骨交接處也。俗名鸞鼻骨。上接臑骨。其臑名曲脈。自肘至腕。有正輔二根。其在下而形體長大。連肘尖者。爲臂骨。其在上而形體短細者。爲轉骨。疊並相倚。下接於腕骨。其臑若出一手。捏住臑頭。一手拿其脈窩。先令直拔下。臑內有聲响。將手曲轉。搭着肩頭。肘骨合縫。其臑上矣。服生血補髓湯。或紫金丹。

第十八則 髃骨斷失

髃骨者肩端之骨。卽肩胛骨也。其曰含納髃骨上端。其處名肩解。卽肩骹與髃骨合縫處也。俗名吞口。一名肩頭。其下附於脊骨。成片如翅者。其骹若脫。手不能舉。使患人低坐。一人抱住其身。將手扳直。用推拿法。酌其重輕。待其筋舒。一手捏其肩。抵住骹頭。齊力拔出。骹內有响聲者。乃復其位矣。用布帶落其跨下。服舒筋活血湯。凡上骹時。骹內必有响聲。活動其骹已上。若無响聲。活動者。其骹未上也。不可悞人。

口餘指抵住下頰。捺下推進。其骭有响聲。齒能合者。上也。服補腎壯筋湯。夫人之筋。賴氣血充養。寒則筋攣。熱則筋縱。筋失營養。伸舒不便。感冒風寒。以患失頸。頭不能轉。使患人低坐。用按摩法。頻頻揉摩。一手按其頭。一手扳其下頰。緩緩伸舒。令其正直。服疏風養血湯可也。

用巧之處也。若斷而未入。

用續筋藥敷之內服壯

筋養血湯可愈。

第十七則 脫下頰附失頸

下頰者。卽牙車相交之骨也。若脫則飲食言語不便。由腎虛所致。其骸曲如環形。與上頰合鉗最難上也。先用寬筋散煎湯薰洗。次用布條裹醫者二母指入。

割恐傷其筋。俟其爛脫。然後去之。治法先用代痛散煎湯薰洗。將其斷骨拔直相對。按摩平正如舊。先用布條縛緊。又將糕匣木板修圓。擲之。又將布條纏縛。再將杉離環抱外邊。取其緊勁挺直。使骨縫無離綻。脫走之患。內服接骨紫金丹。兼調理用地黃湯。四五月後。放擲復看。如其走失。仍照前法。二三月間。換擲數次。百日可痊。凡人斷臂與斷膊。斷腿與斷筋。擲法相同。治分上下。或用器具。與形體相得。隨機變化可也。或筋斷者。難續。蓋筋因柔軟。全斷則縮於肉裏。無

第十一則 接骨論治

接骨者使已斷之骨合攏一處復歸於舊位也。凡骨之斷而兩分或折而陷下或破而散亂或岐而傍竅相其形勢徐徐接之使斷者復續陷者復起碎者復完突者復平皆賴乎手法也。或皮肉不破者骨若全斷動則轆轤有聲如骨損未斷動則無聲或有零星敗骨存內動則淅淅之聲後必潰爛流膿其骨已無生氣脫離肌肉其色必黑小如米粒大若指頭若不摘去潰爛經年急宜去淨如其骨尚未離肉不可生

斃。凡遇此症。不可慌張。候其氣息有無。如無氣者。爲
倒插拳所傷。令患人盤坐。揪其髮。伏我膝上。敲擊其
背心。使氣從口出得甦。服黎洞丸。尾間若蹲墊壅腫。
必連腰膀。服黎洞丸。再服接骨紫金丹。貼萬靈膏。踢
傷海底穴。血必上冲。當時耳內响聲大震。人必昏暈。
先服護心丸。再服紫金丹。

山令其和軟。內服紫金丹。敷定痛散。燒紅鉄烙熨之。
貼混元膏。若骨縫疊出。俯仰不能。疼痛難忍。腰筋僵。
硬。使患者兩手攀索。兩足踏輶上。每足下疊輶三塊。
踏定。將後腰拿住。各抽去輶一塊。令病人直身。又各
去一塊。如是者三。其足著地。使氣舒癰散。陷者能起。
曲者可直。再將腰柱裹住。緊緊縛之。勿令窒碍。但宜
仰臥。不可側睡。脊骨正而患除。服接骨紫金丹。如胸
陷不直者。亦用此法。或氣門傷。則氣塞不通。口噤反。
張。身強如死。過不得三個時辰。若氣從大便出者。立

第十五則 背脊骨傷

背者自後身大椎骨以下。腰以上之通稱也。一名脊骨。一名脊骨。俗呼脊樑骨。其形一條居中。共二十一節。下盡尻骨之端。上載兩肩內繫藏府。其兩旁諸骨附接橫疊而彎。合於前則爲胸脇也。腰骨者。卽脊骨之十四椎。十五椎。十六椎也。尾骶骨。卽尻骨也。其形上寬下窄。上承腰脊諸骨。兩旁各有四孔。名曰八膠。其末節名曰尾間。一名骶端。一名擗骨。一名窮骨。俗名尾樁也。或跌打傷者。瘀聚凝結。脊筋隴起。當先柔

者一年死。第二節傷者二年死。第三節傷者三年死。此穴內應乎肺。傷必吐血咳嗽。凡胸前背後重傷。久則成痰火勞怯。左乳傷發咳嗽。右乳傷發呃逆。凡胸脇諸傷。黎洞丸。三黃寶臘丸。皆可酌用之。再服理肺之劑。以收功。

在胸下岐骨之間。鳧骨者。卽胸下邊肋也。傷者。從前面撞打跌仆者重。從後面來者輕。用手法按摩之。如肋骨斷者。用布纏縛數轉。服接骨紫金丹。外用定痛散熨之。貼萬靈膏。若內蓄瘀血腫痛。偃僂難仰者。服紫金丹。或大便實者。參黃散下之。若受傷日久。胸骨高起。肌肉削瘦。內有邪熱瘀血。痞氣膨悶。睛藍體倦。痰喘咳嗽者。服紫金丹。若傷重。內干胸中心肺兩臟之氣。昏迷目閉。嘔吐血水。呃逆戰慄者。危在旦夕。不治。心坎上橫骨。又名人字骨。從下而上。若第一節傷。

第十四則 顱子骨附胸脇

顱子骨。經名柱骨。橫臥於兩肩前。缺盆之外。其兩端
外接肩解。或擊打偏墜傷斷者。用手法先按胸骨。將
肩端向內合之。揉摩斷骨。令其復位。用帶掛肩於項。
勿使搖動。服接骨紫金丹。外敷定痛散。貼萬靈膏。
愈。胸骨。卽腧骨。一名膺骨。又名臆骨。俗名胸膛。其
兩腋下至肋骨盡處。名脇。脅下小肋。名季脇。俗名軟
肋。統脇肋之總。名曰肱。岐骨者。卽兩髑骨端相接之
處。下卽鳩尾骨也。蔽心骨。卽鳩尾骨也。其質係脆骨。

碎斷斜斷。斷骨有全脫半脫。筋有弛縱卷攣。翻轉離合。在其肉內。以手捫之。自悉其情。法之所施。不知其苦。方爲手法也。傷有關性命者。如七竅上通腦髓。隔近心君。四末受傷。痛苦入心。若元氣素壯。敗血易消。刻期可愈。元氣素弱。一旦被傷。勢必難支。若手法再誤。萬難挽回。尤當慎之。醫者心明手巧。知其病情。善用手法。治之多效。若草率不較。悞人非淺。雖筆之於書。乃活法多端。難以盡述。須得口傳心授。臨症多而活法變庶無悞耳。

醒乍昏時發時止口噤不開語聲不出終屬死症

第十三則 手法論

夫接骨入骺者所賴其手法也。兩手安置其筋骨。仍復於舊位也。其傷有輕重。而手法有所宜失宜。其痊可之遲速。及遺留之殘疾。皆關乎手法之所施也。人身有十二經筋。脈羅列。必知其體。識其部位。機觸於外。巧生於內。手隨心轉。法從手出。或拽之離而復合。或推之就而復位。或正其斜。或完其闕。或骨有截斷。

邪切戒。腦怒高聲。恐有崩裂之患。初服舒腸活血湯。再服八珍湯。調理月餘可愈。或陰囊皮破。腎子掛出。用溫湯擲上。油線縫合。搽玉紅膏。又蓋長肉膏。服調理之劑可愈。或皮不破而腎子入小腹者不治。凡皮肉穿破之症。失血過多。營衛已虛。或被風邪襲入經絡。漸傳入裏。寒熱交作。口噤咬牙。角弓反張。口吐涎沫。身冷自汗。傷口反爲底陷。其毒內攻。其危甚速。投萬靈丹。或大神效活絡丹。以玉真散敷於患處。得膿掀腫。身溫有汗爲效。若前症不退。傷口不高。乍

第十二則 腹傷腸出

如鑱破大小腹。致腸突出者。看腸外衣膜穿破否。若膜穿者。腸必逐條而散也。則不治。若腸雖未出。而內膜已穿。血向內流者。不治。如膜未穿破。雖險可治。又有油膜突出者。亦可治。不可傷其膜。宜敷收膜散。外蓋玉紅膏。翼其漸平。如腸出者。將溫湯浴。煖其腸。不可傷犯。一人將醋和冷水。不令病者知覺。急喫其面。其腸自收。用油線縫合。不可太深。恐傷其肉。摻鐵扇散。搽玉紅膏。外蓋長肉膏。又用布纏腰。數轉。須避風。

若左手持刀而刎者深。右手持刀而刎者淺。一刀勒者深。兩刀勒者淺。如喉腕破而有出入之氣。封藥吸進。必嗆咳。先用雞子內軟衣。蓋於破腕之上。再將口封之。則不嗆矣。如單腕破者。月餘而痊。雙腕破者。兩月而愈。照法治之可也。

搽玉紅膏。又外貼長肉膏。防護風邪。冬天三日。夏下
一二日。照法洗換。自然痛止。其肌漸長。服八珍湯調
治。月餘可愈。如大便閉結。不可妄攻。服麻仁丸至急
者。用膽導法。無損其元。按內景圖云。喉在前主出咽。
在後主納。喉系堅空。連接肺本。爲氣息之路。呼吸出
入。下通諸臟。乃氣化之要道也。咽系柔空。下接胃本。
爲飲食之路。水穀歸胃。下通諸腑。乃轉運之關津也。
若傷之。豈不至險乎。治者須心手相應。不差毫髮。乃
無悞也。而先看其刀彎者。其痕深。其刀直者。其痕淺。

第十一則 咽喉傷

咽喉者乃氣息之路也。或被傷或自刎其症迅速。急則可救。遲則血脫額冷。氣絕不治。乘其氣未絕而身未冷。急用油線縫合。摻止痛散。將止血絮止其血。蓋玉紅膏。又將長肉膏長四五寸。濶二三寸。橫貼連及好肉處。不使封藥脫落。外用布條纏頸。高枕仰臥。使項屈不伸。刀口易合。宜處密室避風。使呼吸舒徐。用人參川米生姜煎湯時時飲之。補接元氣。若二三日後有膿水流出。解去前藥。用甘蔥湯洗淨。摻生肌散。

地閣骨卽兩車相交之骨。又名頰。俗名下巴骨也。上載牙齒。傷之飲食不進。目閉神昏。心熱神亂。服大神效活絡丹。再嚙化人參紫金丹。搽固齒散。外貼萬靈膏。忌風寒冷物。或牙齒傷動者。用蒺藜根燒存性爲末。搯之。或以固齒散搯之。亦佳。

第十則 傷耳

耳者。司聽之竅也。耳門名曰蔽耳輪。名曰郭。或被砍跌打落。或上脫下粘。或下脫上連。須撚正。用封藥敷貼。若全脫落。急用綴法。將兩耳相對。用藥貼定。再以竹夾子直上橫縛可全。又有玉梁骨。卽耳門骨。其處上卽曲頰。下卽頰車。兩骨之合鉗也。內通腦髓。亦關靈明。若傷者。腫痛流血。服接骨紫金丹。外用八仙道遙湯薰洗。貼混元膏。若傷重。內動腦髓。及傷靈明。昏沉不省。若平素氣血皆虛者。不治。

頭暈痛連腦髓。若傷及會厭。與上橫骨重。則不能言。
痛連心膈。昏迷沉重者。險。急用膩粉。冰片細研。吹於
患處。以止其血。服接骨紫金丹。再用鱗黃血竭煎湯。
日漱口二三十次。如飲食難進。以柿霜玉露霜。牛奶
或奶油。或粉粥麵粥等物。以涼潤將息得法。可愈。

第九則

唇口玉堂傷

唇口者。司言食之竅也。或傷破唇缺。先用油線縫合。敷止血生肌散。蓋玉紅膏。內服健脾養胃湯可愈。或含刀誤割其舌。將斷而未落者。用雞子內軟衣袋舌。將止痛生肌散。蜜調敷舌上。頻頻添換。使患人仰臥。薄粥灌喉。不動其舌。則易愈。又有玉堂在口內上腭。一名上含。其竅卽頰頰也。若觸刺傷其左右者。惟腫而已。若傷正中之孔。上通於頰。必傷鼻孔之卷肉。或犯空竅。則血流不止。以致鼻目皆腫。滿面青紫。神倦。

散用銀針蘸井花水。將藥點眼珠上。及點血筋上。用
舊絹溫湯挪上。服還睛湯二三劑。又服明目地黃湯。
調理可愈。

第八則 鼻樑骨斷附目傷

鼻樑骨下至準頭傷而出血可治。外將止血定痛散敷之內服接骨紫金丹。或傷開孔竅。或鼻破歪落。用整端法用藥敷貼可也。若骨破碎。內膜穿破。口鼻流血者。不治。中血堂。卽鼻內頰下脆骨空處也。若傷之血流不止。神氣昏迷者。宜塞鼻丹塞於鼻中。用冷水淋激頭頂。視其人如氣虛。內服人參紫金丹。如血瘀服蘇子桃仁湯。若血流不止。飲食不進。氣虛目閉面黃者。八日而死。或睛明骨傷。眼珠掛落者。先將收珠

洗云前藥。摻生肌散。貼玉紅膏。宜避風寒。忌食發物。
火酒。若皮破血流不止。骨陷筋翻。必損腦髓。氣息無。
聲。則危篤難醫。若破傷風者。照前傷風法治之。山角。
骨。卽頭頂兩旁稜骨也。凌雲骨。在前髮際下。卽正中。
額骨。卽額顙也。左右天賢骨者。卽兩額角也。睛明骨。
卽目窠四圍目眶骨也。眉稜骨。其下曰頤骨。下接上。
牙床也。若傷之。均照前囟骨傷法治之可也。然臨症。
之權衡。用藥之巧妙。神而明之。存乎其人。

第七則 顙門骨傷

顙骨者卽嬰兒頂骨未合時軟而跳動之處名顙門。或跌打損傷骨縫雖綻尙未震動腦髓其頭面浮光眼腫鼻大唇翻舌硬睡臥昏沉肉雖腫而皮未破瘀血內蓄者宜扶起正坐以葱汁調定痛散敷於傷處用粗紙蘸醋貼于藥上燒鉄熨斗烙紙上以傷處覺熱疼口中有聲爲度去藥貼萬靈膏二三日一換用和傷湯洗之自然腫消痛止或皮破血出不止用止血絮封固內服和營養衛湯若潰爛流膿用甘怒煎

者不治。或頂骨塌陷。驚動腦髓。七竅出血。身挺僵厥。昏悶全無知覺者。不治。或骨碎髓出不治。或皮開肉綻。血流不止者。可治。用止血絮封固。先止其血。服補氣養血湯。宜避風寒。戒怒遠色。俟其結痂。若潰爛流膿。用甘葱煎洗去封藥。摻鐵扇散。蓋玉紅膏。服疏風養血湯。照法洗換。待其結痂全愈。

並托其手腕。頻頻揉摩兩手脉窠。凡傷則筋脉強硬。頻頻揉摩。則心血來復。命脉流通。即可回生。再服接骨紫金丹。外用散瘀和傷湯洗去前藥。換敷混元膏。或大便乾燥。乃內存瘀血。服加減蘇子桃仁湯。或耳聾者。用導氣通瘀錠塞耳中。食宜素粥。切戒惱怒。忌油膩麵食。臥宜淨室。勿令人喧擾。若重傷已死者。用白布纏頭。以木棍輕輕拍擊足心。再提髮合其頸端。直舒其筋絡。外敷混元膏。內服紫金丹。如外皮未破。而骨已碎。內膜已穿。血向內流。聲啞不語。面青唇黑。

第六則 顛頂骨傷

顛頂骨男子三叉縫女子十字紋。一名天靈蓋。位居至高內函腦髓以統全體者也。或跌打礮撞等傷。卒然而死。身體強直。口鼻尚有出入之氣。心口溫熱跳動者。可救。惟宜屈膝盤坐。先將醋調混元膏敷於頂上。再將草紙捲點燃着。令煙氣薰其口鼻。或炭或鐵燒紅。淬入醋內。使熱氣薰其口鼻。引五臟血脈之氣通和。待其口中呻吟有聲。用童便調入麝散。或黎洞丸亦可。俟其氣轉陽回。外用手法按摩心胸兩腋下。

須問其或翻車墜馬或高處墜下或打重跌倒再問
或思食不思食若四肢無傷精神不減或能坐起行
動者輕或昏睡不語或疼痛呼號瘀聚凝結腫硬筋
脹者重投三黃寶臘丸服接骨紫金丹數萬靈膏熨
定痛散手法詳後

第五則 從高墜下傷

凡人從高墜下。跌傷五臟。不省人事。氣塞不通者。看其兩太陽及胷前脅下如何。若動則可救。急用通關散吹鼻中。如有噤語聲得出者。投黎洞丸再服。復元活血湯逐瘀生新。若遲則不救。或有從高倒墜。天柱骨折。致頸插入腔內。而左右尚活動處。用提法治之。或打傷頭低不起。用端法治之。或墜傷左右歪斜。用整法治之。或傷而面仰。頭不能垂。或筋長骨錯。或筋聚筋強。頭垂不起者。用推端續整四法治之。臨症時。

下傷透至內者。腸傷斷者。小腹下傷入內者。證候繁多者。傷破陰子者。老人左股壓碎者。血出盡者。肩內耳後傷透於內者。脈不實者。已上諸證。不必用藥。

穢不堪犯此八者難治凡鬪毆時向上打爲順氣平
打爲塞氣倒揀打爲逆氣凡人血隨氣轉氣順則血
順氣逆則血逆塞則氣閉逆則上冲是以傷有平塞
順逆之別若治之不辨危在須臾又有五絕之論一
看兩眼白睛上紅筋多則瘀血亦多若直視無神不
治二扳擎其指甲血卽還原者可治不還原者不治
三若腳趾與手指甲俱黑者死四陽物縮者不治五
腳底之色臘黃者難治此五絕之症也又有十不治
之證顛撲損傷入於肺者縱未卽死二七難過左脇

傷內腎離位。或笑或哭者立死。或胃陽受傷吐糞。或泄糞者立死。孕婦足踢小腹者難治。重傷後氣出不收。眼開者不治。口如魚嘴。吹沫纏風者不治。小腹重傷。不分陰陽者難治。或跨物失足。騎傷陽物。始而溺孔出血。繼則玉莖腫脹。小便點滴不通。小腹堅實者。死于七日內。不治。又有八忌。一忌傷腦髓。出二忌傷臂中跳脉。三忌傷小腹膀胱。四忌傷海底穴。五忌傷內臟。六忌傷氣海咽喉痰聲如鋸物。七忌疼在不傷處。兩目直視。八忌血出不止。先赤後黑。肌肉腐爛。其

第四則 至險之證不治論

凡至險之症有氣管全斷者不治。若稍連續者可治。或氣管捏扁氣塞不通。醫將二指撚正其管用通。關散吹鼻取嚏可也。或天柱骨斷。額冷脉絕者死。或顙門骨破髓出者不治。若內膜不穿髓不出者可治。或食飽受傷及跌損內臟者不治。若過得三日可治。或耳後壽台骨破血流不止者難治。胸口大痛青色累心者死。兩乳重傷痛極呼吸不得者難治。或腎囊皮破腎子掛出者可治。腎子入小腹者不治。或腰眼重

藥餌恐其血凝難化。遺留後患也。凡視重傷。先解除衣服。遍觀傷之重輕。穴之致命與否。察色聞聲。脉探虛實。如六脉和緩者生。九候不調者死。陰囊內有腎子者可治。如入小腹者不治。如牙關閉。急用開牙散搽之。若能甦醒。再投黎洞丸。或可挽回。醫者須細心審察。不可草率誤人。

別部位若瘀在上而吐血者宜犀角地黄湯在中者
桃仁承氣湯在下者抵當湯虛人宜佐以四物湯若
瘀散復元通氣散調之或傷處青腫堅實痛難轉側
脈濇而滯者防其氣瘀上冲宜投參黃散逐瘀又宜
復元活血湯或受傷日久纔醫者敗血堅凝宜服紫
金丹逐瘀又祛傷散疏通爲要俟其色散淡血和痛
止爲度或有牙關緊閉用通關散吹入鼻中取嚏投
三黃寶臘丸或奪命丹如口開納藥者可治不納藥
者危須忌濕地當風坐臥忌食生冷硬物忌服寒溫

第三則 跌打損傷內治證

凡跌打損傷之證惡血留內則不分何經皆以肝爲主。蓋肝主血也。敗血必歸於肝。其痛多在脇肋小腹者皆肝經之道路也。宜疏肝調血行經爲主。王好古云登高墜下撞打等傷心腹胸中停積瘀血或氣瘀攻冲昏迷不醒或寒熱往來日輕夜重變症多端醫者不審其原不切脉之虛實不分經絡臟腑妄投藥劑枉死者多矣。故臨症時須察脉之虛實審症輕重藥配君臣佐使治分老幼強弱卽從上中下三焦分

血氣損傷。或過服尅伐之劑。或外敷寒涼之藥。致氣
血凝結者。宜活血順氣之法。夫損傷雜證。不及脩載。
俱分門晰類。詳列於後。學者宜盡心焉。

第二則 治傷法論

夫跌打損傷墜墮磕碰之證專從血論。或有瘀血停積。或爲吐血過多。然後施治。庶不有悞。若皮不破而內損者。多有瘀血停滯。或積於臟腑者。宜攻利之。或皮開肉綻。吐血過多者。宜補而行之。更察其所傷。上下輕重淺深之異。經絡氣血多少之殊。先逐其瘀。而後和營止痛。自無不效。內經云。形傷則痛。氣傷則腫。又曰。先腫而後痛者。形傷氣也。先痛而後腫者。氣傷形也。凡打撲閃錯。或惱怒氣滯。血凝腫痛。或因叫號。

怒二忌喜笑三忌高聲四忌勞力五忌妄動六忌熱羹粥飲七忌過酒八忌酸鹹此八者犯之鮮有得生者亦有不可治者九曰傷腦曰傷天倉曰傷臂中跳脉曰傷大小腸曰傷五臟此九者皆死又有難治者四腦破髓出及咽喉中沸聲兩目直視并痛在不傷處經曰出血不止前赤後黑或肌肉腐爛寒凝堅實其瘡難愈有此四者皆不可療更按其脉之虛細沉小和緩者生若浮洪數大急疾者死如失血過多急宜人參補氣卽經所謂陽生陰長之義耳

無後患。凡服湯藥。必以和營養衛爲主。若有傷風身熱腫痛等象。視其脈浮無力。則病在太陽。宜羌活湯。若脈長有力。則病在陽明。宜承氣湯下之。脈緊而芤。則病在少陽。宜柴胡湯和解之。若傳變入裏。則不治矣。夫金瘡變易。各有治法。或居於邊疆。偶爲刀箭所傷。非得勝之藥。安能治之乎。虎鈴經曰。人爲兵器所傷出血者。必口渴甚。不可妄與熱湯及熱酒。須乾食肥膩之物。取其解渴而已。斯無妨害。卽熱粥亦不宜多飲。多則血沸出不止。其所忌蓋有八焉。一忌喫

隨經而治。轉危爲安矣。凡金瘡初治。輕者當出血之。
時用止血絮封固傷口。急止其血。如無所犯。待其結
痂自愈。重者筋斷血飛。摻如聖金刀散。用止血絮絮
住血止後。若腫潰。去其前藥。再塗玉紅膏。外蓋陀僧
膏。止痛生肌。初服二黃寶蠟丸。若腫痛服黎洞丸。如
出血過多。面黃眼黑。不可攻瘀。宜服八珍湯。甚者獨
參湯。先固根本。凡初傷時。切忌熱湯淋洗。恐冒湯火
之毒。若傷口腫潰流膿。用甘草煎洗淨。再摻金鎗鉄
一兩散。收濕拔膿。外蓋玉紅膏。止痛生肌。防護風邪。可

忌咳嗽嘔噦。亟宜避風爲妥。夫風屬巽木。肝之氣也。瘡屬庚金。肺之候也。如瘡口被風邪所客。則木旺生火。反剋肺金。而成破傷風矣。致瘡口浮腫潰爛流膿。變生諸症。甚則憎寒壯熱。口噤目斜。身體強直。角弓反張。危在旦夕。救之不及者。死。其看法須辨瘡口之淺深。脉象之虛實。年歲之老少。稟賦之厚薄。若胃氣益旺。飲食如常。此爲最善。蓋脾胃屬土。土生萬物。爲陽氣之元。陽氣旺。則陰血易生。尤須戒怒。絕慾。怒則瘡口迸裂。變生腐肉。慾則瘡口腐爛。易損新肌。所賴

傷科補要卷之二

上海錢秀昌松溪氏編輯

男 丹書杏園

全較

婿何錦華鶴汀

第一則 金鎗論治

夫金瘡者乃刀斧劍刃之所傷也故名曰金瘡蓋木乃春之權金乃秋之令春則萬物始生故春屬震乃東方甲木之氣也秋則萬物凋零故金屬兌乃西方庚金之氣也金瘡之色最喜者淡紅故吉多而凶少最惡者紫黑故少吉而多凶但金屬肺患金瘡者則

第三十五則 運燠灸倒四法灸臍化痞法附

第三十六則 應刺諸穴

卷二
第二十六則 損傷出血吐血

第二十七則 胸腹脇肋痛悶

第二十八則 腹痛腰痛

第二十九則 杖傷夾棍傷

第三十則 藥箭傷

第三十一則 諸咬傷

第三十二則 湯火傷

第三十三則 救自縊法

第三十四則 救溺水

第十七則 脫下頰附失頸

第十八則 髀骨斷失

第十九則 曲肱斷

第二十則 手腕斷

第二十一則 髀骨斷

第二十二則 大捷骨膝蓋骨

第二十三則 胫骨腳踝跗骨

第二十四則 受傷著寒及懷孕而傷

第二十五則 受傷感痧疫論

傷斗有要
卷二十三
三十六則目錄

第八則 鼻樑骨斷附目傷

第九則 唇口玉堂傷

第十則 傷耳

第十一則 咽喉傷

第十二則 腹傷腸出

第十三則 手法論

第十四則 顙子骨附胸脇

第十五則 背脊骨傷

第十六則 接骨論治

傷科補要

治傷三十六則目錄

第一則 金鎗論治

第二則 治傷法論


第三則 跌打損傷內治證

第四則 至險之證不治論

第五則 從高墜下傷

第六則 顛頂骨傷

第七則 凶門骨傷



Amey

W B

700

L5335

1818


pt. 2



455/51

Beginning of Part 2

End of Part 3



FRENCH BOOKSTORE
PEIPING (CHINA)
北平法文圖書館



歌

蟲蟲散用牡丹皮

二味兼和乾漆灰

曰

若遇宿傷酒飲下

瘀消痛止最相宜

專治宿傷蓄瘀凝結能化瘀爲水

牛蟲蟲

一兩

牡丹皮

一兩

乾漆灰

五錢

夏天將牛身上飽血蟲虫陰乾爲末和丹皮漆灰
酒冲服

能消痰降氣

降香 五錢

歸鬚 二兩

地鱉虫 五錢

共爲細末酒調下

硫射散

歌

硫射硫黃及射香

不能言語此方良

曰

服之卧破人牽滾

吐出痰涎無禍殃

此藥能吐去惡物

硫黃

射香

共爲末滾水冲服

蟲散

瓜皮散

歌

瓜皮散二味

炒脆牛皮膠

曰

爲末酒調服

汗淋病自消

治傷後發汗

冬瓜皮

牛皮膠等分

爲細末酒調服

勝金散

歌

勝金散降香

地鱉及歸鬚

曰

其末酒調服

遍身疼痛除

蘇合丸

歌

蘇合丸須蘇附良

射安薰陸木丁香

曰

冰犀白朮沉香合

煉蜜硃衣臘壳鑲

治一切惡毒之氣中人關竅不通者服之能通關

辟邪解毒

蘇合香

二兩

元射香

三錢

安息香

三錢

薰陸香

三錢

廣木香

五錢

水沉香

五錢

母丁香

五錢

香附子

二兩

冰片

三錢

白朮

五錢

犀角

三錢

煉蜜爲丸硃砂爲衣外蠟爲壳

滑石 六兩

甘草 二兩

琥珀 五錢

青黛 八分

共研細末每服三錢燈心湯下

玄妙飲

歌

玄妙飲療湯火毒

芩連花粉共元參

曰

山梔炒黑陳皮桔

甘草和中藥不爭

此方能解湯火之毒

黃連

花粉

元參

黑山梔

陳皮

桔梗

甘草

黃芩

用河水煎溫服

治瘋犬咬毒逐惡物血片從小便而出

蟹螯

按日數用之如犬咬七日用七個十日用十個去翅足加糯米同炒焦黃色去米用螯

滑石

二兩

雄黃

一錢

射香

二分

共研細末每服酒下一錢不飲酒者米湯調下

琥珀碧玉散

歌

琥珀碧玉散生甘

滑石能調六腑宣

曰

青黛研和同琥珀

灯心湯下溺如泉

淋者

治服扶危散後毒物血片填塞莖中小水澁痛如

歌

碣鐵石研末

水仙根搗汁

曰

調和塗瘡上

鉄物隨能出

治鐵珠入肉不出

碣鐵石

水仙根

將碣鐵石爲細末再將水仙根搗爛絞汁和塗患處

扶危散

歌

扶危散內主蟹螯

按日加添糯米炒

曰

滑石雄黃元射少

酒吞瘋犬毒能消

曰 烏頭蘇降蛇含石 檀射星龍輕粉方

治一切瘡口濕爛腫痛等處摻之

花蕊石 二兩

紫蘇 五錢

厚朴 五錢

白芷 三兩

乳香 五錢

羌活 五錢

沒藥 五錢

細辛 四錢

草烏 三錢

龍骨 五錢

蘇木 五錢

降香 五錢

當歸 二兩

檀香 五錢

蛇含石 五錢

射香 三分

南星 三錢

輕粉 三錢

其爲細末敷摻傷處

碓鐵散

歌

定痛湯和血

紅花乳沒靈

曰

蒲黃芩續斷

歸尾及桃仁

治夾棍後調理之劑

乳香

沒藥

紅花

當歸

秦芩

川斷

蒲黃

五靈脂

桃仁

水酒各半煎服

花蕊石散

歌

花蕊乳香沒藥羌

紫蘇朴芷細辛當

逐瘀定痛散

歌

逐瘀歸鬚索五靈

紅花赤芍共桃仁

曰

乳香末藥川山甲

甘草和中痛自寧

治夾棍後瘀血不散

歸尾

三兩

胡索

二兩

紅花

二兩

五靈脂

三兩

赤芍

一兩五錢

桃仁

二兩

甘草

五兩

川山甲

二兩

乳香

沒藥

各兩五錢

共爲細末陳酒調服

定痛和血湯

共研爲末煉蜜爲丸

化癰散

歌

化癰大黃乾漆桃

紅花土狗青皮調

曰

川芎枳朴和甘草

赤芍歸鬚飲卽消

治杖後癰毒上攻一切蓄癰作痛

大黃

三兩

乾漆

五錢

桃仁

三兩

土狗

二兩

青皮

二兩

川芎

二兩

枳實

二兩

五錢

厚朴

二兩

赤芍

二兩

五錢

歸鬚

二兩

甘草

五錢

紅花

二兩

右藥共爲細末煉蜜爲丸

地龍

官桂

蘇木 各九分

麻黃 七分

歸尾 二錢五分

桃仁 九分

黃柏

甘草 三錢五分

共爲細末水調服

護心丸

歌

護心丸內用牛黃

血竭辰砂乳沒方

曰

木耳灰研蜜煉服

攻心之患不須防

治湯火之患毒氣攻心及瘀血上冲昏暈等症

牛黃 一錢

血竭 四錢

辰砂 飛爲衣

木耳灰 二兩

乳香

沒藥 各二兩五錢

白 芫硝紅甘草

蓄瘀立時康

治損傷蓄血腹痛大便不通

大黃

芫硝

枳實

厚朴

紅花

甘草

水煎服

地龍散

歌 地龍散治脊腰傷

官桂麻黃黃柏當

曰 蘇木桃仁和國老

太陽留血水煎嘗

治腰痛脊痛因瘀血留太陽經

右藥水煎

當歸導滯散

歌

當歸導滯散

一兩大黃君

曰

歸用二錢半

射香少許羣

治腹脹胸痛大便不通喘咳吐血及血瘀停滯

大黃

當歸

射香

共爲細末磁器收貯

加味承氣湯

歌

加味承氣湯

大黃朴實當

生地

熟地

右方用河水煎服

加味歸脾湯

歌

加味歸脾參朮芪

茯神遠志棗仁歸

曰

木香梔子丹皮草

龍眼煎加薑棗隨

治胸腹不利食少無寐脾氣鬱結

人參

黃芪

白朮

茯神

棗仁

梔子

遠志

木香

當歸

丹皮

龍眼

甘草

羌活

獨活

連翹

防風

乳香

沒藥

生地

杜仲

續斷

人參

白朮

白芷

用河水煎服

聖愈湯

歌

聖愈湯芎歸

參芪二地隨

曰

血亡并肉凋

筋惕服斯宜

治筋惕肉凋亡血過多之證

人參

黃芪

川芎

當歸

荊芥

右方以河水煎服

當歸補血湯

歌

當歸補血芎歸芍

乳沒翹防獨與羌

曰

杜斷地黃兼白芷

氣虛參共朮芪嘗

古方僅用歸芪者

亦號當歸補血湯

治出血過多脉浮洪大重按全無血虛發熱者宜

之

黃耆

當歸

川芎

芍藥

當歸

川芎

赤芍

生地

百合

側柏葉

荊芥

黃芩

梔子

大黃

共爲末陳酒或童便調服

加味芎歸湯

歌

加味芎歸湯

川芎百合良

曰

當歸同白朮

荊芥水煎嘗

治傷損嘔血形體虛弱

當歸

川芎

百合

白朮

黃芪

人參

當歸

白朮

柴胡

升麻

陳皮

甘草

以河水煎服

百合散

歌

百合芎歸赤芍地

丹皮犀角鬱金連

曰

芩梔側柏生軍芥

童便調和立可痊

治打撲傷損敗血流入胃腕色如荳汁從嘔而出
形體實者宜之

犀角

鬱金

丹皮

黃連

曰 氣弱人宜服

陽生陰長全

此治氣虛怯弱扶元固衛

白朮

人參

白朮

甘草

右藥以河水煎服

補中益氣湯

歌

補中益氣芪朮陳

升柴參草當歸身

曰

虛勞內傷功獨擅

亦治虛陽外感因

木香蒼朮易歸朮

調中益氣暢脾神

治虛勞內傷中氣下陷

加味逍遙散

歌

加味逍遙歸芍荷

柴胡白朮茯苓扶

曰

丹皮河水山梔服

肝火平時血自和

治肝經火鬱胸脇悶痛日晡發熱

柴胡

當歸

白芍

薄荷

白朮

茯苓

丹皮

山梔

右藥共爲末白滾湯送下

四君湯

歌

四君湯參朮

苓草棗薑煎

再造紫金丹

歌

再造金丹元射冰

西黃文蛤共千金

曰

茅菇大戟雄黃配

外着硃砂血染新

治一切穢惡痧暑之毒山嵐瘴氣閉塞臟腑經絡

昏迷不醒嘔吐等症

元麝

二兩五錢

冰片

二兩五錢

西黃

七分半

文蛤

七兩五錢

硃砂

七錢五分

千金霜

五兩

茅菇

七兩

雄黃

五兩

大戟肉

七兩

右藥共研極細末飯搗和爲丸硃砂爲衣

蟾酥丸

歌

蟾酥烱化共爲丸

茅朮硃砂丁射甘

曰

雄大二黃宜配合

二麻重用治痧痊

治一切痧穢等惡氣中人臟腑服之卽愈

射香

三錢

丁香

六錢

大黃

兩

雄黃

三兩六錢

茅朮

三兩

麻黃

三兩六錢

天麻

三兩六錢

硃砂

三兩六錢

蟾酥

九錢

甘草

三兩四錢

右藥共研細末將燒酒化烱蟾酥爲丸如不敷

再加糯米糊和爲丸硃砂爲衣

條芩

白朮

砂仁

用河水煎服

人馬平安散

歌

人馬平安散治痧

西黃元麝共礪砂

曰

火硝金箔梅花片

飛淨硃砂搐鼻瘥

治一切痧暑穢惡之氣着人觸鼻即安

西黃

錢

麝香

一錢

礪砂

錢

火硝

錢

梅花冰片

錢

金箔

百張

硃砂

六兩

共研爲細末

治傷後着寒通經活絡去瘀

麻黃

桂枝

紅花

白芷

細辛

桃仁

赤芍

甘草

用河水煎服

安胎和氣飲

歌

安胎和氣飲

歸芍地黃芎

曰

白朮條芩入

砂仁爲末沖

治孕婦受傷

當歸

白芍

生地

川芎

好沉香

丁香

川牛膝

白雲苓

白蓮蕊

肉從蓉

兔絲子

當歸

酒洗

熟地黃

牡丹皮

宣木瓜

各二兩

山藥

八錢

人參

廣木香

各錢

五茄皮

蛇床

各二兩

其爲未煉蜜爲丸如彈子大每服三錢用無灰

酒送下

麻桂溫經湯

歌

麻桂溫經湯治寒

紅花白芷細辛

曰

桃仁赤芍薑蔥入

國老和中危自安

沒藥 三錢

丁香 五錢

右方用水酒煎服

補筋丸

歌

補筋丸熟地

山藥牡丹皮

曰

蓮蕊蓰蓉膝

蛇床絲子肥

茄皮沉丁木

參朮木瓜歸

煉蜜爲丸服

筋傷可挽回

治筋翻筋攣筋脹筋粗筋聚骨錯血蠟壅滯宣腫

青紫疼痛等證

草五錢同煮長香三炷取出晒乾如琥
珀色明亮可用

右藥共爲細末煉蜜和丸如桐子大每服三錢空

心淡鹽湯送下 冬日淡黃酒送下

補筋湯

歌

補筋歸地芍

乳沒白雲苓

曰

碎補丁陳入

紅花酒煮吞

治跌撲傷筋血脉壅滯宣腫青紫疼痛等證

當歸

二兩

熟地黃

白芍藥

各二兩

紅花

乳香

白茯苓

骨碎補

各二兩

陳皮

二兩

崑治跌打損傷血虛氣弱下部腰膝腿疼痛痿軟無力步履艱難服此藥至一百日舒筋止痛活血補氣健旺精神

龜膠

蛤粉炒成珠

鹿角膠

製膏上

虎脰骨

酥油炙

何首烏

黑豆拌蒸晒各九次

川牛膝

酒洗晒乾

杜仲

姜汁炒斷絲

銷陽

威靈仙

酒洗

當歸

各二兩酒洗晒乾

黃蘗

酒洗晒乾鹽水拌少許酒炒

人參

善

羌活

大川附子

一兩五錢童便鹽水各一椀生薑二兩切片同煮

白芍

微炒

雲白木

各二兩土炒

熟地

二兩

一日令極熟水乾再添鹽水煮畢取出剝皮切片又換淨水入川黃連五錢

赤芍

歸尾

川芎

蘇木

陳皮

乳香

桃仁

續斷

烏藥

沒藥

木通

甘草

右藥以河水煎服

健步虎潛丸

歌

健步虎潛丸

首烏虎脰堅

曰

鎖陽參朮地

薑附威靈仙

龜鹿膠黃蘗

羗牛杜仲全

當歸同白芍

煉蜜共爲丸

治上骭後補虛之劑

生地

白芍

川芎

黃芪

杜仲

茄皮

牛膝

紅花

當歸

續斷

用河水煎服

和營止痛湯

歌

和營止痛芍歸芎

蘇木桃仁續斷同

曰

烏藥陳皮共乳沒

木通甘草輔成功

活血通經止痛去瘀生新之劑

曰 牛膝茄皮并杜仲

紅花枳壳又通經

治失骸後調理之劑

羌活

防風

荊芥

獨活

當歸

續斷

青皮

牛膝

茄皮

杜仲

紅花

枳殼

用河水煎服

生血補髓湯

歌

生血補髓湯

芍地芎芪當

曰

杜仲茄牛膝

紅花續斷膏

歌

補腎壯筋湯

萸牛熟地當

曰

茄皮苓續斷

杜仲芍青方

治腎經虛損常失下頰

熟地

當歸

牛膝

山萸

雲苓

川斷

杜仲

白芍

青皮

五茄皮

用河水煎服

舒筋活血湯

歌

舒筋活血羌防荆

獨活當歸續斷青

杜仲

河水煎服

寬筋散

歌

寬筋散羌防

續斷桂枝當

曰

芍藥和甘草

筋舒痛自良

寬筋止痛

羌活

一兩

防風

一兩

續斷

一兩

桂枝

四錢

當歸

一兩五錢

芍藥

一兩

甘草

四錢

共爲末陳酒調下

補腎壯筋湯

熟地黃

山萸肉

淮山藥

白茯苓

牡丹皮

建澤瀉

以河水煎服

壯筋養血湯

歌

壯筋養血芍歸芎

續斷紅花生地同

曰

牛膝丹皮杜仲炒

筋舒血活自然鬆

治傷筋絡調理之劑

白芍

當歸

川芎

川斷

紅花

生地

牛膝

丹皮

曰 二鳥同何首

敷洗痛如無

敷傷處便覺麻木其痛可止

生川烏 五錢

乳香 二兩

沒藥 二兩

草烏 五錢

何首烏 二兩

蟾酥 三錢
火酒燂化

共爲末用燒酒調敷或薑汁亦可

地黃湯

歌 地黃湯六味

熟地山萸濟

曰 淮藥共丹皮

澤瀉茯苓利

治陰虛怯弱肝腎不足之證

玉真散

歌

玉真散用芷星風

羌附天麻好和同

曰

熱酒一鍾敷服後

破傷風症奏神功

治破傷風瘡口潰爛諸證

南星

防風

白芷

天麻

羌活

白附子

各等分

右爲末每服二錢熱酒一鍾調服更敷患處

代痛散

歌

代痛散蟾酥

乳香沒藥多

治破傷風重症發汗通經解一切毒

茅朮

米泔炒
八兩

全蝎

石斛

天麻

川芎

羌活

防風

荆芥

細辛

川烏

湯泡去
姜汁煮

草烏

製厚

何首烏

雄黃

六錢
研

當歸

麻黃

炙草

各二兩

右爲細末煉蜜爲丸每藥一兩分作四九一兩

作六九一兩作九九三等做下以備年歲老壯

病勢緩急取用預以硃砂六錢研細水飛爲衣

磁瓶收貯

曰 續斷紅花并枳壳

木通利水卽安寧

治腹傷腸出等症

川芎

歸身

桃仁

大腹皮

青皮

紅花

續斷

延胡索

枳殼

木通

大黃

水煎溫服

萬靈丹

歌

萬靈茅朮蝎歸芎

石斛天麻荆芥雄

曰

羌細麻黃甘草共

二烏何首及防風

桃仁

右方以總藥爲末煉蜜爲丸白湯送下

收膜散

歌

收膜散內用烏梅

五蟬綠礬佐使隨

曰

若遇油膜來突出

醋調敷上立收回

烏梅

一兩
去核

五蟬

五錢

綠礬

三錢

共研爲末醋調敷上立收

舒腸活血湯

歌

舒腸活血索歸芎

桃核將軍大腹青

瓜兒血竭

各錢五分

麝香

五錢

地龍

五錢七分

淨松香

五錢

兩頭尖

川芎

各二兩

京牛黃

片腦

各錢五分

共爲細末煉蜜爲丸金箔爲衣每丸重一錢以蠟皮封裏溫酒化送隨病上下食前後服

麻仁丸

歌

麻仁丸潤腸

歸尾大黃羌

曰

桃核麻仁共

蜜丸白水嘗

治血燥便閉潤腸養血之劑

歸尾

大黃

麻仁

羌活

炙甘草

官桂

草豆蔻

羌活

元參

天麻

藿香

何首烏

白芷

川連

黃蓍

熟地黃

川大黃

各二兩

遼細辛

赤芍藥

硃砂

飛

沒藥

去油

乳香

去油

直殭蠶

蜜炙

天竺黃

敗龜板

酥炙

丁香

虎脰骨

酥炙

烏藥

青皮

黑附子

白蔻仁

炒

骨碎補

白茯苓

於白朮

土炒

當歸

酒洗

沉香

各二兩

全蠍

去毒

葛根

威靈仙

各二兩五錢酒浸

犀角

硃砂乳沒真天竺

血竭松香碎補還

白蔻芎歸苓朮葛

羌防麻桂細辛關

天麻烏藥青皮藿

黑附丁香虎脰端

何首元參連白芷

黃芪熟地大黃頌

威靈草蔻牛黃射

犀角沉香赤芍安

冰片生甘和鼠糞

拘攣諸痺盡可餐

此丹宣暢氣血通利經絡並風濕諸痺口眼喎斜

半身不遂行步艱難筋骨拘攣手足疼痛等證

白花蛇

酒浸焙

烏梢蛇

酒浸焙

麻黃

去節

防風

端洗跌仆損傷腫硬疼痛及一切冷振風濕筋骨
血肉肢體痠痛諸證

防風

荊芥

川芎

甘草 各錢

當歸

酒洗

黃栢

茅山蒼朮

牡丹皮

川椒

各三錢

苦參

五錢

共入白布袋內紮口水煎滾薰洗患處

大神效活絡丹

歌

神效活絡治瘋癰

四十八味煉成丹

曰

烏白二蛇全蝎炙

姜蚕龜板地龍乾

歌

止痛生肌散象皮

兒茶乳沒石膏煨

曰

黃丹三七均爲末

刀斧諸傷摻效奇

能長肉生肌收口

象皮

二兩

兒茶

三錢

乳香

五錢

沒藥

五錢

石膏

二兩

黃丹

三錢

三七

五錢

共爲細末摻傷口上

八仙逍遙湯

歌

八仙逍遙湯

荆防黃栢當

曰

苦參芎椒合

甘草牡丹蒼

健脾養胃湯

歌

健脾養胃朮參芪

歸芍陳皮共小茴

曰

山藥茯苓兼澤瀉

中宮健運却無虞

調理脾胃之劑

人參

白朮

黃芪

歸身

白芍

陳皮

小茴

山藥

雲苓

澤瀉

右方用河水煎服

止痛生肌散

右方用河水煎服

明日地黃湯

歌

明目地黃湯澤瀉

茯苓山藥牡丹皮

曰

山萸枸杞兼甘菊

石決當歸白蒺藜

調理傷目之劑極效

生地

澤瀉

茯苓

山藥

萸肉

枸杞

甘菊

當歸

石決明

白蒺藜

丹皮

右藥用河水煎服

治眼珠落出者點之

血竭 二錢

冰片 二分

乳香 四錢 去油

沒藥 四錢 去油

右藥共爲極細末磁瓶收貯

還睛湯

歌

還睛湯固本

白茯苓人參

曰

枸杞菴蓉入

二冬二地存

治目傷睛暗者可以還光

人參

雲苓

枸杞

肉菴蓉

天冬

麥冬

生地

熟地黃

通筋血被跌仆閃撞而氣虛者最宜服之

人參 三錢

丁香 二兩

五茄皮 二兩

甘草 八錢

茯苓 二錢

當歸 二兩

骨碎補 二兩

血竭 二兩

五味子 二兩

沒藥 二兩

共爲細末煉蜜爲丸每服三錢早晚沒黃酒化

服或童便化服亦可

收珠散

歌

收珠散血竭

冰片乳香方

日

沒藥同爲助

星眸復舊光

治失血傷痛難忍者用之

當歸 二兩

乳香 一兩

沒藥 一兩

桃仁 二兩

川斷 二兩

烏藥 八錢

荊芥 五錢

防風 錢

白芍 二兩五錢

木通 五錢

甘草 五錢

陳皮 二兩

右藥共爲細末酒調服

人參紫金丹

歌 人參紫金歸苓甘

碎補加皮五味全

曰 血竭丁香同沒藥

氣虛血脫服之痊

此丹提補元氣健壯脾胃止渴生津增長精神和

曰

輕粉兒茶竭

黃連共末成

治穿潰損爛生肌收斂

眞珠

琥珀

龍骨

象皮

黃連

冰片

輕粉

兒茶

血竭

共研細末磁瓶收用

止血定痛散

歌

止血定痛用當歸

乳沒桃仁續斷隨

曰

烏藥荆防同白芍

木通甘草共陳皮

歌

疏風養血湯

荊芥其羌防

曰

芎芩秦芎薄

紅花花粉當

治破傷失血後調養之劑

荊芥

羌活

防風

川芎

花粉

白芍

秦芎

薄荷

紅花

當歸

用河水煎服

生肌散

歌

生肌珠粉珀

龍骨象皮冰

補氣養血湯

歌

補氣養血湯

四君四物裏

曰

黃芪和肉桂

氣血自然康

治營衛不足氣血兼補之劑

人參

白朮

甘草

白茯苓

生地

當歸

白芍

川芎

黃芪

肉桂

以河水煎服

疏風養血湯

水二鐘煎一鐘渣二鐘煎八分溫服

導氣通瘀錠

歌

通氣導瘀錠

巴豆共蟬蛻

曰

元射葱涎蜜

耳聾也可療

耑治耳聾之奇方

用不去油巴豆一箇蟬蛻三箇射香少許以葱涎
蜂蜜和捻如麥粒形絲棉裹置耳中響聲如雷勿
得驚懼待二十一日耳中有膿水流出方可去錠
奇妙無比

水五碗煎滾入醋二兩再煎十數滾薰洗患處

一日數次

加減蘇子桃仁湯

歌 蘇子桃仁湯潤腸 麥冬歸芍竹茹良

曰 紅花蘇木能消瘀 加減陳皮水煮嘗

治瘀血內聚心經瘀熱大腸干燥者

蘇子 三錢 蘇木 一錢末 紅花 一錢 桃仁 炒

麥冬 橘紅 各三錢 赤芍 竹茹

當歸 各二錢酒洗

自然銅

紅花

血竭 三錢

射香

丁香

番木鱉 一錢
油燥 毫

共爲細末黃酒溫服或童便調亦可

散瘀和傷湯

歌

散瘀和傷水醋煎

紅花木鱉共生甘

曰

葱鬚碎補生半夏

薰洗諸傷數次痊

治一切礮撞損傷瘀血積聚

番木鱉

油燥 毫

原紅花

生半夏

各五錢

骨碎補

甘草

各三錢

葱鬚

一兩

羚羊血 五錢

沒藥 五錢

漏蘆 三錢

紅花 三錢

大黃 二錢

麝香 三錢

升麻 三錢

白及 五錢

生梔子 二錢

明雄黃 五錢

白歛 三錢

甘草 二錢

共爲細末用社醋熬成膏敷於頂上

八厘散

歌

八厘然銅半兩錢

紅花木鱉射丁全

曰

乳香沒藥同蘇木

血竭調和酒服痊

治跌打損傷接骨散瘀

蘇木麪 一錢

乳香 三錢

沒藥 三錢

半兩錢 一錢

曰 蟾酥共川椒 醋搗敷如失

以敷傷處即能止痛但皮肉破者不用

川烏 蠶 草烏 蠶 乳香 二兩 白龍 二兩

蟾酥 蟾酥 化步許 沒藥 二兩 川椒 二兩

共為末醋調敷患處

混元膏

歌 混元膏用羚羊血 沒藥漏蘆白芨甘

曰 梔子大黃升雄射 紅花白欵醋熬煎

治打撲損傷骨碎筋翻瘀血凝聚消青紫腫痛

川附子

製

半夏

製

萆薢

鹿茸

各三錢

虎脛骨

一對

射香

二錢

乳香

一兩

右除血竭沒藥射香三味各研細末另包外共

二十三味先將香油十觔微火煨浸三日然後

將羣藥入油內熬黑爲度去渣加黃丹五觔再

熬將至滴水成珠離火俟少時藥溫將血竭沒

藥射香下入攪勻取起出火氣

定痛散

歌

定痛散龍骨

一烏并乳沒

丁香根與茅山木

牛膝茄皮桂附川

萆薢鹿茸虎脰射

秦菖夏斛木香全

治跌打損傷消瘀散毒舒筋活血止痛接骨如神

兼去麻木風痰寒濕疼痛等證

鶴筋草

透骨草

當歸

酒洗

自然銅

醋淬七次

丁香根

血竭

沒藥

各二兩

川芎

八錢

赤芍

二兩

紅花

二兩

半兩

錢

一枚醋淬

川牛膝

五茄皮

石菖蒲

蒼朮

各錢

木香

秦艽

蛇床子

肉桂

石斛

治一切骨碎損斷服之能續

地龍 一兩

龍骨 二兩

射香 五兩

自然銅 三兩

川烏 二兩

姜製

滑石 四兩

水飛醋炒

地鱉甲 二兩

赤石脂 二兩

醋炒

乳香 一兩五錢

沒藥 一兩五錢

鹿角霜 二兩

各爲極細末用鹿角膠烊化搗和爲丸如彈子
大硃砂爲衣陳酒化下

萬靈膏

歌

萬靈膏共蛇床煎

透骨鶴筋二草仙

三

赤芍紅花芎歸竭

然銅乳沒半兩錢

開牙散

歌

開牙用烏梅

細嚼爛如泥

曰

冰射同研末

牙開藥可擠

治牙關緊閉藥不得入

烏梅肉

冰片

麝香

右藥將烏梅嚼爛冰射細研合塗牙上卽開

接骨紫金丹

歌

接骨然銅地鱉虫

地龍龍骨射香同

曰

石脂鹿角川烏引

滑石調和乳沒功

曰 紅花歸尾桃仁竭 碎補將軍硃射紅

治一切重傷險症臟腑蓄瘀危急之候服之能通

關竅

歸尾 三兩

桃仁 三兩

血竭 五錢

地鱉虫 二兩

兒茶 五錢

乳香 一兩

沒藥 一兩

自然銅 二兩

紅花 五錢

大黃 三兩

硃砂 五錢

骨碎補 二兩

射香 五錢

共爲細末用黃明膠熟化爲丸硃砂爲衣每用

一丸陳酒磨冲服

通關散

歌

通關散皂末

白芷細辛研

曰

冰射蟾酥及

吹鼻得嚏痊

吹鼻中取嚏通經之要藥

牙皂

五錢

白芷

三錢

細辛

三錢

冰片

二分

射香

二分

蟾酥

五分

共爲極細末收入磁瓶內用

奪命丹

歌

奪命丹中地鱉虫

兒茶乳沒自然銅

歌

祛傷散輔配均加

續桂全歸兼五茄

曰

羌獨芎牛堪作使

細辛烏藥及紅花

二烏製入兼甘草

經絡之傷酒服佳

能通經活絡散寒去瘀疏散之藥

川斷

一兩五錢

全歸

二兩

羌活

二兩

獨活

二兩

茄皮

一兩五錢

川芎

五錢

牛膝

二兩

肉桂

三錢

草烏

五錢

細辛

四錢

烏藥

二兩

紅花

五錢

川烏

五錢

甘草

五錢

共爲細末熱酒冲服

紫金丹

歌

紫金沒藥自然銅

血竭川烏土狗同

曰

蘇粉降香松節末

乳香龍骨助成功

消瘀止痛能去骨節經絡之宿傷

沒藥

一兩

血竭

五錢

降香

一兩

自然銅

二兩

乳香

一兩

松節

一兩

蘇木

一兩

川烏

一兩

土狗

一兩

即蟻蛄

龍骨

五錢

共爲極細末糯米粥湯搗和爲丸硃砂爲衣

祛傷散

柴胡 錢

甘草 錢

青皮 兩

共爲細末酒調送下

復元活血湯

歌

復元活血湯柴胡

花粉當歸山甲俱

曰

桃核紅花大黃草

損傷瘀血酒煎祛

治損傷積血能祛瘀生新

柴胡

花粉

當歸

山甲

桃仁

紅花

大黃

甘草

用陳酒煎服

水調服

參黃散

歌

參黃三七大黃君

朴實桃仁歸尾臣

曰

赤芍紅花山甲片

鬱金胡索桂甘青

柴胡引用爲佐使

實體初傷用酒斟

治體實重傷逐瘀下降疏通之要藥

參山七

一兩

大黃

四兩

厚朴

一兩

枳實

一兩

桃仁

三兩

歸尾

三兩

赤芍

一兩

紅花

五錢

穿山甲

五錢

鬱金

二兩

胡索

一兩

肉桂

五錢

養血通用之劑

生地

當歸

白芍

川芎

以河水煎服

復元通氣散

歌

復元通氣木茴香

山甲青陳貝母良

曰 白芷漏蘆甘草共

瘀消氣暢不爲殃

治氣滯不舒瘀結作痛

木香

茴香

川山甲

青皮甘草

陳皮

白芷

貝母

漏蘆

歌

抵當水蛭及蟲蟲

桃核將軍猛烈雄

曰

蓄瘀逢之頃刻化

虛人體弱莫輕攻

治下焦蓄瘀不解服此能散瘀若體弱之人忌服
宜四物加味可也

水蛭

蟲蟲

桃仁

大黃

用河水煎服先去渣溫服如不下再服二煎

四物湯

歌

四物地芍與歸芎

血家百病此方通

曰

八珍合入四君子

氣血雙療功獨崇

河水煎服

桃仁承氣

歌

桃仁承氣五般奇

甘草硝黃併桂枝

曰

熱結膀胱小腹脹

如狂畜血最相宜

治中焦蓄血小腹滿如狂等症

桃仁

去皮尖研

大黃

芒硝

桂枝

甘草

以上河水煎服

抵當湯

柴胡

人參

半夏

黃芩

甘草

加姜棗煎服古方用人參如力艱者可以黨參代之

犀角地黃湯

歌

犀角地黃芍藥丹

血升胃熱火邪干

曰

斑黃陽毒皆堪治

或益柴芩總伐肝

治上焦蓄血胃火上冲而吐及斑黃陽毒等症

生地

白芍

丹皮

犀角

歌

承氣朴芩硝

大黃枳實邀

曰

救陰并瀉熱

急下獨功超

治陽明症燥實便閉不通

大黃

芩硝

厚朴

枳實

用水煎服

柴胡湯

歌

柴胡湯解表

甘草與人參

曰

半夏黃芩共

煎加姜棗吞

治少陽半表半裏之症

羌活湯

歌

羌活防風湯

甘芍藁本當

曰

細辛榆白芍

在表服之康

治破傷風邪在太陽經等症

羌活

防風

細辛

藁本

白芍

川芎

當歸

地榆

甘草

加生薑黑棗煎服

承氣湯

右藥共爲極細末磁瓶收貯

和營養衛湯

歌

和營養衛用參芪

歸芍防風及桂枝

曰

苓朮陳甘加薑棗

血虛之症服斯宜

此方氣血並補調理之劑

人參

黃芪

當歸

白芍

白朮

防風

雲苓

桂枝

陳皮

甘草

加姜棗煎服

治諸瘡有膿水者洗淨用藥

甘草

大胡葱

以上二味煎濃湯候溫可洗患處

金鎗鐵扇散

歌

金鎗鐵扇散

松柏降材香

曰

乳沒明礬共

象皮和末鑲

治破傷流血及潰爛收濕拔毒生肌

乳香 二兩

沒藥 二兩

明礬 二兩

松香 二兩

降香 二兩

象皮 二兩

老材香

即香樹三兩之陳皮也

黃栢 二兩

歌

八珍四物四君勻

地芍芎歸治血眞

曰

參朮苓甘能補氣

調和營衛有奇勲

治失血過多之後氣血兩虧服此以調營衛

生地

當歸

白芍

川芎

人參

白朮

茯苓

甘草

以上俱以河水煎服分兩隨症輕重

甘慈煎

歌

甘慈二味煮成湯

洗諸般膿水瘡

曰

換貼膏時先淨洗

庶無穢氣藥相當

京牛黃

冰片

麝香 各二錢五分

阿魏

雄黃 各二兩

大黃

兒茶

三七

天竺黃

瓜兒血竭

乳香

沒藥 各二兩

籐黃

二兩隔湯煮十數滾去滓用羊血五錢拌晒無山羊節以羊血代

以上十三味共為細末將籐黃化開為丸如芡

實大若乾稍加白蜜外用蠟皮封固內服用無

灰酒送下外敷用茶油磨稠粘塗之忌一切生

冷發物

八珍湯

以上各稱足分兩各研爲末如無眞天竺黃以眞膽星三兩代之再用好黃蠟二十四兩鍊淨滾湯生定將藥投入不住手攪勻取出裝磁罐內備用

黎洞丸

歌

黎洞丸中牛射冰

雄黃天竺大黃藤

曰

兒茶血竭參三七

阿魏還同乳沒稱

治跌打損傷瘀血奔心昏暈不省及一切無名腫毒昏困欲死等證

在旦夕重者一錢輕者三分用無灰酒送下立刻
全生如被烏鎗打傷鉛子在內危在傾刻服一錢
吃酒數杯睡一時汗出卽愈如敷將香油熱化少
許鷄翎掃患處服藥後忌涼水生冷燒酒三日不
忌此酒則藥無功

天竺黃 三兩

雄黃 二兩

藤黃 四兩隔湯燉
十數次去沫

紅芽大戟 三兩
去骨

劉寄奴

騏驎竭 各三兩

歸尾 一兩五錢

硃砂

兒茶

乳香 去油

琥珀

輕粉

水銀

同輕粉研
不見星

麝香 各三錢

篩入攪極勻傾入水盆內衆手扯干餘下再收入
磁盆內常以水浸之

三黃寶蠟丸

歌

三黃寶蠟古來傳

天竺勝雄劉寄全

曰

歸尾兒茶麒麟竭

水銀水粉共爲研

硃砂琥珀同元射

乳戟調和化蠟丸

跌打諸傷皆可服

力傷成怯亦能痊

端治一切跌打損傷及破傷風並傷力成癆女人
產後惡露不盡致生怪證瘀血奔心痰迷心竅危

此膏專貼諸般惡瘡流注癰瘰跌撲損破金刃悞傷等證用之

南陀僧

二十兩 槩

赤芍

二兩

全當歸

二兩

乳香

五錢 去油研

沒藥

五錢 去油研

赤石脂

二兩 研

苦參

四兩

銀黝

一兩

百草霜

二兩 筋研

桐油

一兩

香油

一兩

血竭

五錢 研

孩兒茶

五錢 研

川大黃

半兩

右藥先將赤芍當歸苦參大黃入油內燂枯熬至

滴水不散再下陀僧末用槐柳枝攪至滴水將欲

成珠將百草霜細細篩入攪均再將羣藥及銀黝

紫草 二兩

全歸 二兩

生地 二兩

象皮 二兩

乳香 二兩

沒藥 二兩

甘草 二兩

合歡皮 二兩

右藥用麻油觔半煎枯去渣再入

黃占 四兩

白占 二兩

血竭 二兩

以上共煎至滴水不化成膏聽用

陀僧膏

歌

陀僧膏貼惡諸瘡

流注癰瘤跌撲傷

曰

赤芍陀僧歸乳沒

苦參銀鋤赤脂良

桐香油共兒茶竭

百草霜礞鋤大黃

白

松香三共研成末

止血兼收膿水乾

治金瘡出血不止或潰爛流膿撥於患處能止血
燥濕

松香

七歲

生礬

枯礬

各兩錢

共研為極細

末磁礬收貯

玉紅膏

歌

玉紅紫草共生計

歸地象皮并合歡

曰

乳沒麻油加血竭

煎收須用白黃占

治一切瘡口能止痛生肌長肉

治初傷時血流不止將絮封上其血立止

元參

茜草

寄奴

大黃

黃芩

黃柏

烏梅

五蟬

以上等分煎三次去渣留淨汁再用

旱蓮汁

馬蘭汁

皂礬

京墨

百草霜

同煎濃用好綿絮收乾二汁與社醋

同煎滾時入礬墨草霜將絮收之

如聖金刀散

歌

如聖金刀用二礬

生枯二味煉爲丹

傷科補要卷之三

上海錢秀昌松溪氏編輯

男 丹書杏園

全較

婿何錦華鶴汀

湯頭歌括

止血黑絨絮

歌

止血先將黑絮封

元參茜草寄奴同

曰

大黃芩柏烏梅等

五蟬綠礬京墨濃

百草霜研入社醋

旱蓮搗汁馬蘭冲

煎來收得真元色

血沸逢之立斷紅

瓜皮散

勝金散

疏射散

蟲蟲散

百合散

加味芎歸湯

當歸補血湯

附古

聖愈湯

加味歸脾湯

當歸導滯散

加味承氣湯

地龍散

護心丸

化瘀散

逐瘀定痛散

定痛和血湯

花蕊石散

礞鐵散

扶危散

琥珀碧玉散

玄妙飲

蘇合丸

地黃湯

壯筋養血湯

寬筋散

補腎壯筋湯

舒筋活血湯

生血補髓湯

和營止痛湯

健步虎潛丸

補筋湯

補筋丸

麻桂溫經湯

安胎和氣飲

人馬平安散

蟾酥丸

再造紫金丹

加味逍遙散

四君子湯

補中益氣湯

導氣通瘀錠

補氣養血湯

疎風養血湯

生肌散

止血定痛散

人參紫金丹

收珠散

還睛湯

明目地黃湯

健脾養胃湯

止痛生肌散

八仙逍遙湯

大神效活絡丹

麻仁丸

收膜散

舒腸活血湯

玉真散

代痛散

桃仁承氣湯

抵當湯

四物湯

復元通氣散

參黃散

復元活血湯

紫金丹

祛傷散

通關散

奪命丹

開牙散

接骨紫金丹

萬靈膏

定痛散

混元膏

八厘散

散瘀和傷湯

蘇子桃仁湯

傷科補要

諸方目錄

止血黑絨絮

如聖金刀散

玉紅膏

陀僧膏

三黃寶蠟丸

黎洞丸

八珍湯

甘葱煎

金鎗鐵扇散


和營養衛湯


羌活湯

承氣湯

柴胡湯

犀角地黃湯







Amex

w 8

700

C5335

1818

2.3



455151

Beginning of Part 3

End of Part 4

FRENCH BOOKSTORE

PEIPING (CHINA)

北平法文圖書館

解漆毒

一州牧以生漆塗囚眼囚卽盲一村叟見而憐之
語以蟹搗汁滴眼內漆當隨汁流散瘡亦愈矣如
其言覓得一小蠬用之目睛果愈畧無損 或成
紅斑爛瘡取生蠬黃塗之不數次卽愈

一方用杉木煎汁洗之

解食鱧魚龜鼈蝦蟆自死禽獸等毒

豆鼓一合新汲水煎濃燉溫服之可解

傷科補要卷四終

解藜蘆毒者用雄黃爲末溫酒調服一錢

一方用葱煮汁服

解雄黃毒

漢防已煎湯飲之 有用雄黃搽瘡或薰陰囊受毒用防已煎湯洗敷數次愈

解杏仁毒

藍子研水服則解

解服丹毒

地漿服之爲上 一方用蚌肉食之良

葛粉二合水調服可解薑湯調服亦解

解花椒毒

冷水飲之卽解或地漿水更妙

解諸菜毒

食後多腹脹者是中諸菜毒也以醋解之

解半夏毒

生薑搗汁飲之有中此毒口不能言倒地將死者
速用薑汁灌之須臾自甦

藜蘆毒

中蠶毒

凡食蟹中毒用紫蘇葉濃煎汁飲之或用紫蘇子搗汁飲之亦良或擣藕汁或搗蒜汁飲之俱可解或用冬瓜汁或食冬瓜亦可

食牛馬中毒

粉草搗無灰酒服當吐瀉若渴者不可飲水飲水必死

一方淡豆鼓搗人乳服之卽解

食斑鳩毒

飲酒中毒者經日不醒是也謂之中酒用黑豆一升煮汁溫服一盞不過三盞卽愈

解麴毒

只以蘿蔔生啖之或搗汁服之麥麴性熱蘿蔔能解其性或用大蒜嚼食之亦善解麴毒

解一切食毒

凡一切飲食之毒及飲酒不知所傷何毒卒急無藥可解者亦用薺芎甘草剉細煎濃停冷去渣分作三服或加蜜少許煎服與前飲饌方同

右爲末煉蜜爲丸如桐子大另以青黛爲衣卽
名解毒丸如稍覺精神恍惚卽是誤中諸毒急
取十五丸嚼爛用新汲水送下或用水浸蒸餅
尤佳

飲食中毒

凡中飲食毒而覺煩熱脹滿者急用苦參三兩苦
酒一升半煮半沸陸續飲之吐出毒食卽瘥或以
水煮亦得 或用犀角湯亦可解

中酒毒

神聖膏用車脂輦油不拘多少卽研如膏調磁石末攤紙上如錢許貼之每日二換

諸刺入肉

諸刺入肉外傷之證也輒淺者以針撥出硬深者搗螻蛄塗之少時卽出如刺已出而仍作痛者再以螻蛄塗之卽愈

解百物毒

誤食毒草或中蠱毒

板藍根

洗淨晒乾四兩

貫衆

毫

青黛

研

生甘草

各兩

飲好醪二升諸蟲化爲水而毒亦消

誤吞水銀

用黃泥作丸涼水送下其水銀混入泥中可從大便而出或飲生羊血亦可解

鐵針入肉

凡鐵鍼誤入肉中無眼者不動有眼者隨氣流走若走向心窩胸膈者險急用烏鴉翎數根炙焦黃色研細末酒調服一錢或二錢俱可外用神聖膏貼之三五次其針自出前法用在一二日間效

屢驗一書云井中生蛭以白馬骨投之卽無試之
亦驗夫蛭卽螞蝗也雖死爲末見水復活人誤吞
之爲害不小治以前法無不應驗

諸蟲入耳

百虫入耳用藍汁灌之或葱汁尤良或猪肉少許
炙香置耳孔邊亦出或用細蘆管入耳內口吸之
蟲隨出

蜈蚣入耳以鹽少許搽入耳內卽化爲水

蜈蚣入耳以雞肉置耳邊自出凡蟲毒入腹作脹

治吞釘鐵金銀等物但多食肥羊脂肥肉等味可
隨大便而下

一方吞錢者燒炭末白湯調服數匙卽出 或服
蜜升許

消治吞髮繞喉不可取出將自己頭髮作灰白湯調
服可消

治吞鐵物用錫糖半斤濃煎艾汁調和服之

誤吞水蛭

治吞水蛭食蜜卽愈試以活蛭投蜜中卽化爲水

煎湯化下

一方魚骨鯁用細茶五倍子等分爲末吹入咽喉立愈

一方以犬弔一足取其涎徐徐嚥之卽消

又方用白萼花根搗爛取汁徐徐咽之不可着牙齒

治稻芒糠穀鯁

鯁稻芒糠穀者將鷺弔一足取其涎徐徐咽下卽消

誤吞銅鐵金銀

多食肥肉以利便或食乾飯以逼送不宜飲水或食錢者多食茨菇以化之

吞針

誤吞針者以不切韭菜同蚕豆煮食或茶面粉又食水鷄眼睛一對其眼在針兩頭戴出

冬月水鷄必於桑樹

下土掘取

治諸骨硬

諸骨鯁喉用苧麻根杵爛丸如彈子大將所鯁物

治骨硬

橄欖

野苧根

狗涎水

或醋煎威靈仙加

砂糖服

解河魴毒

中河魴毒者以金汁解之或糞清或以香油吞吐俱可

解火酒醉死

浸髮貼腐飲葛根湯氣汁水或菉豆湯

誤吞麥芒

以鴨涎水飲之

解水銀入耳

以黃金枕耳邊自出若水銀入肉令人筋攣以金物熨之水銀乃出蝕金其病卽瘥

解煤薰毒

飲冷水可解或蘿蔔搗汁灌口鼻移向風吹便能醒轉

解飲饌毒

凡中飲饌之毒不知何物卽煎甘草湯薺芩湯飲之便治

治吞金

中黃金毒者食鷓鴣肉中白銀毒者以黃連甘草解之又洗金以鹽駱駝驢馬脂餘甘子皆能柔金
羊脂蘘子皆能柔銀吞金銀入腹中當服食前品
柔則易出

又服金者用真輕粉細水調下能金從大便而出
解藥蟲金石毒

治一切藥毒蟲毒及金石諸毒用一石蠟以熱水磨服

解輕粉毒

用黑鉛五斤打壺一把盛燒酒十五斤納土茯苓半斤乳香三錢封固重湯煮一日夜埋土中出火毒每日早晚任飲數盃渴時以瓦盆接之當有粉出服至筋骨不痛乃已

中冰片毒飲以新汲冷水可解

救服酒

服鹽酒將常用擦卓布洗水灌之使吐卽解或多飲豆腐漿亦可

傷和補要 卷四
自見本草楓樹菌食之笑不止俗言笑菌居山間
不可不知此法也

解毒蕈

誤食毒蕈至吐卽採生金銀花嚼之可解

解草烏頭毒

用飴糖黑豆冷水解之

解射罔毒

用甘草汁或小豆葉浮萍薺苳汁冷水解之

薺苳又名

甜桔梗河南人呼爲杏
葉沙參能解百藥之毒

又用芭蕉葉搗自然汁服之卽止

解蟹螯芫青毒

用猪膏大豆汁或鹽汁藍汁服之或用鹽湯煮猪膏巴豆飲之又或用大小黑豆汁服之並瘡用肥皂水灌之再以鷺翎絞喉數次令吐卽活

治菌毒

四明溫台間山谷多產菌然種類不一食之間有中毒徃徃至殺人蓋蛇虺毒氣所薰蒸也有僧教掘地以冷水攪之令濁少頃取飲皆得全活其方

者用井水於石上磨出黑水旋磨旋灌砒消則愈
卽先吐出之後亦宜服鉛水以解餘毒方無後患
中砒霜毒急取熱鴨血灌之立解又糞清灌之亦
解又方以豆鼓濃煎湯飲之亦解又用甘草汁同
藍汁飲之亦可用熱豆腐漿灌之亦效

解巴豆毒

中巴豆毒下痢不止者以大豆一升煮汁飲之
又巴豆畏大黃黃連蘆笋菰筍藜蘆各煎冷服皆
能止泄

救驚斃

驚怖死者以溫酒一兩盞灌之卽活

救驚蹶猝死

卒暴隨擲築倒及鬼魘死若肉未冷急以酒調蘇合香丸灌入口若下候去可活

解砒毒

砒霜服下未久者取鷄正一二十個打入碗內攪勻入明礬末三錢灌之吐則再灌吐盡便愈但服久砒已入腹則不能吐出急用黑鉛四兩重一塊

寸令目開血出卽活

視上唇內沿有如粟米粒以針挑破

又用皂角或生半夏末如大豆許吹入兩鼻

又用羊屎燒烟熏鼻中

又綿浸好酒半盞手按令汁入鼻中及捉其兩手
勿令驚須臾卽活

又灸臍中百壯鼻中吹皂角末或研韭汁灌耳中
可活

又用生菖蒲研汁一盞灌之

繩刺入鼻中

又鹽湯灌之

又研韭菜汁半盞灌鼻中冬月用根亦可得嚏

又灸兩足大拇趾聚毛中三七壯

聚毛乃足趾向上生毛處

又方皂角末如豆許吹兩鼻內得嚏則氣通三四

日者尙可救

魘死者若身未冷急以酒調蘇合丸灌之卽活

救中惡

凡中惡客忤猝死者或先病及睡臥間忽然而絕
皆中惡也用韭黃心於男左女右鼻內刺入六七

凡凍死已經救活者宜用生薑帶皮搗碎陳皮搗碎用水
三升煎一碗溫服

救魘

魘死不得用燈火照并不得近前急喚但痛咬其
足跟及足大拇趾頻頻呼其名及唾其面再灌以
薑湯必活

魘不醒者移動小臥處徐徐喚之卽醒夜間魘者
原有燈卽存燈無燈者不可用燈照

又用筆管吹兩耳及取病人頭髮二七莖撚成

盛熨心上冷卽換之候目開以溫酒及清粥稍稍
與之若不先溫其心便以火炙則冷氣與火爭必
死

又用毡或藁荐捲之以索繫定放在平穩處令二
人相對踏令滾轉往來如扞毬法候四肢溫卽活
冬月溺水之人及被凍極之人雖纖毫人事不知
但胸前有微溫皆可救倘或微笑必爲急掩其口
鼻如不掩則笑而不止不可救矣切不可驟令近
火但一見火則必大笑不可救藥

帛上令徹臍腹但煖則漸甦也如倉猝無湯處掬
道上熱土於臍端以多爲佳冷則頻換後與解暑
毒藥或道塗無湯處卽掬熱土於臍上仍撥開作
窩子令衆人旋溺於中以代熱湯亦可取效

凡中暑如已迷悶嚼大蒜瓣冷水送下如不能嚼
卽用水研灌之立醒路中倉卒無水渴甚急嚼生
葱二寸許和津同咽可抵飲水二升

救凍死

凍死四肢直口噤有微氣者用大鍋炒灰令煖袋

急救良方類

救中暈

暈死於行路上旋以刀錐掘開一穴入水擣之取爛漿以灌死者卽活

中暈不省人事者與冷水吃卽死可急取灶間微熱灰壅之復以稍熱湯蘸手巾熨腹脇間良久甦醒不宜便與冷物吃

暑月熱倒急扶在陰涼處切不可與冷水飲當以布巾衣服蘸熱湯覆臍下及氣海間續以湯淋布

姜黃昏睡好方服藥酒可盡醉送下葷用猪肉
過口素用葷腐過口服後避風有微汗出爲效
忌房事酸寒茶醋等物及諸般血虛弱者間五
六日一服壯實者間三日一服

右如法製度爲極細末每服二錢壯者三錢陳酒送下核桃四五枚過口

透骨丹

治撲打損傷深入骨髓或隱隱痛或天陰則痛或年遠四肢沉重無力此藥主之真神方也

鬧楊花子

一兩火酒浸炒三次童便浸三次焙乾

乳香

沒藥

不啻

真血竭

各三錢

各爲末稱准和均再加射香一分再研磁餅收貯封固每服三分壯者五六分不必用夜飯准

活血丹

治跌撲損傷神藥

劉寄奴花頭

桃仁去皮尖

加皮

山楂

地盤王

用酒浸死晒乾各罇

紅花

當歸

酒洗

延胡索

醋煮

牛膝

酒洗

牡丹皮

香附

各三兩童便浸炒

蓬朮

醋炒

青皮

蘇木

枳實

川芎

降香末

山稜

醋炒

凌霄花

赤芍

威靈仙

檳榔

各二兩

乳香

去油

沒藥

各二兩

大黃

八兩陳酒煮乾

附方

傷最重者服之

山甲 炒爲末

歸尾

紅花

生地

靈仙

茄皮 各三錢

川芎

乳香

沒藥

花粉 各五分

甘草 三分

血竭 二分

桃仁 打碎四十九粒

大黃 五錢

水酒各一碗煎好臨服加重便一盃服後瀉出

瘀血爲效後再服活血丹調理痊愈 若打撲

氣閉已死者先用通關散 見中風門吹入鼻中有嚏

者後服此藥自活

紅黃色漸漸化盡其膏如鏡面可以照人將膏滴水試老嫩貼手不粘爲度如老加麻油如嫩加冰片百草霜一兩攪勻再入後藥

地蟹虫

一兩

血竭

五錢

象皮

五錢

龍骨

三錢

海螵蛸

三錢

眞珠

二錢

乳香

五錢
去油

沒藥

五錢
去油

人參

二錢

共研極細末並入膏內攪勻

和傷治血湯

治損傷瘀血腹脹內壅紅腫暗青瘀痛昏悶欲死

附方

治跌打斷骨破傷

大黃 二兩

川芎

當歸

生地 各兩

紅花 三錢

川連 三錢

甘草 三錢

荊芥 三錢

肉桂 三錢

白芨 三錢

白蘇 二錢

冰片 一錢

用麻油一筋先將藥片入鍋內用柳枝攪勻俟

藥渣枯色以麻布絞去藥渣入黃占白占各三

兩白芨白蘇末同熬滾至滴水不化頃入淨水

缸內將膏在水中稔長一塊分作五塊漸入大

鍋內溶化膏入帶水氣油花滾泛滿鍋看藥泛

血竭

髮灰

茅根

韭根

各等分葷便酒煎服

虎骨散

治跌打損傷愈後筋不能伸

黃荊子 二兩

川續斷 錢

獨活 錢

秦艽 錢

海桐皮 錢

鷄骨節

虎骨節

龍骨

犬骨節

各等分以酒炙爲末陳酒服

象皮膏

南星 二錢

草烏 二錢

姜汁炒

鬧楊花 三錢

半夏 二錢

共爲末黃麻根蕁麻子根芋芳葉三味打汁拌

南星四味晒乾再研極細聽用

陰紅湯

凡婦人損傷用

阿膠

髮灰

沒藥

等分酒煎加童便服

血竭散

凡跌打血流口出

早晚服

八厘寶

治痛極難忍服之覺寬但宜避風

川芎

草烏

半夏 各三錢

麻黃 一錢

蟾酥 五分

南星 四錢

以酒浸晒乾爲末再將芋芳葉絞汁并濕晒乾
研細酒下八厘

楊花散

割開肉上敷之麻木

香研入膏內攤貼

藥酒方

治跌打損傷筋骨疼痛

參三七

紅花

生地黃

川芎

當歸身

烏藥

落得打

乳香

五茄皮

防風

川牛膝

乾薑

牡丹皮

肉桂

延胡索

姜黃

海桐皮

各五錢

入絹袋放瓶內用酒五觔隔湯煮三炷香爲度

荊芥

川斷

生地

紫荊皮

麻黃

黃栢

苦參

桃仁

丹皮

肉桂

獨活

髮灰

各五錢

大黃

用麻油一觔將大黃紅花等藥浸內夏天二日
冬天四日入銅鍋熬藥枯黑色濾絹去渣入薑
葱汁各二碗又熬再濾過入冰片一錢又熬再
濾過入鍋加黃占四兩淨百草霜二兩同熬膏
取起下細藥射香一錢乳香沒藥各一兩同射

海桐皮

獨活

赤芍藥

秦艽

五茄皮

川斷

當歸尾

內桂

牡丹皮

生地

川牛膝

防風

廣陳皮

姜黃

童便酒煎食遠服

射香膏

凡跌打骨碎皮破等用之

紅花

白芷

牛膝

各二錢

歸尾

一兩

蘇木

茄皮

靈仙

各二錢

防風

桃仁 四錢

加薑二片童便酒各半煎服

車前湯

凡大小便不通者用之

車前子

枳壳

歸尾

赤芍

木通

桔梗

大黃

芒硝 各錢

童便酒煎服

海桐皮湯

凡足傷用之

杏仁湯

跌打肚腹疼痛用之

杏仁 三錢

生大黃 五錢

桃仁 三錢

歸尾 一錢

甘草 三分

童便老酒煎服

桔梗湯

凡跌蹠損傷大小便不通

桔梗 三錢

紅花

蘇木

苾硝 各五錢

猪苓

澤瀉 各三錢

大黃 二兩

歸尾 五錢

白芷

生地

蔓荊子

紅花

當歸

川芎

白朮

各等分水酒各一鍾煎服

杜仲湯

凡腰脊傷痛用之

肉桂

烏藥

杜仲

生地

赤芍

丹皮

歸尾

胡索

桃仁

川斷

各錢

童便酒煎服

加姜三片水煎服

桂枝湯

凡傷手或傷臂用之

桂枝

枳壳

陳皮

紅花

香附

生地

歸尾

胡索

防風

赤芍

獨活

各等分童便陳酒煎服

蔓荊湯

凡眼目損傷用之

桃仁 各三錢

川膝

杜仲

川芎 各三錢

毛薑 二錢

川斷

薤皮

防風

羌活 各三錢

花粉 二錢

甘草

姜黃 五分

右爲細末入瓶內臨用配服

川芎湯

治頭面傷

川芎

白芷

防風

當歸

赤芍

生地

羌活

陳皮

黃荊子

花粉

薤皮

共爲細末糯米湯丸

鷄鳴散

治胸腹蓄血

歸尾 五錢

桃仁 三錢

大黃 二兩

酒煎鷄鳴時服至天明攻下瘀血卽愈

君臣散

治跌打損傷

肉桂 二兩

紅花

歸尾

赤芍

丹皮

生地

烏藥

胡索

自然銅二兩八錢
煨一錢 骨碎補一錢

另放自然銅其各藥共爲細末和均用老米飯打糊爲丸分作六十九每丸加自然銅末三分辰砂爲衣每服酒磨一丸

一粒金丹

端治週身筋骨疼痛諸藥不效者服此除根

射香二錢

真京墨一錢
炒去烟

乳香一錢

沒藥一錢

白松香一兩

五靈脂一錢

當歸一錢

地龍一錢

番木鱉七分

草烏七分

閃氣散

治閃氣傷脇肋疼痛

射香 二錢

雄黃 五

共為細末入藥瓶內每遇閃氣者將藥點在眼

潭內睡一晷即愈

回生丹

治極重損傷垂危等症

五茄皮 二兩五錢

川牛膝 二兩五錢

當歸身 五錢

炙甘草 四錢

木耳 二兩三錢

黃麻灰 五錢

鹿角膠 二兩

川山甲 二兩

沒藥

硼砂

血竭

土鳖虫

等分共爲細末

洞蠻方

治跌撲損傷拳泛嘔逆筋骨疼痛

牛黃五分

射香三分

冰片錢

大黃

天竺

鬱金

乳香

沒藥

兒茶

血竭錢

雄黃

阿魏

共爲細末煉蜜丸如綠豆大硃砂爲衣每服二

丸好酒送下

白芷 一錢

天麻 酒洗 一錢

麻黃 一錢

當歸 一錢

甘草 五分 炙

加生姜煎服

行軍金瘡方

平時將雌雄雞血對相晒乾研末敷患處卽收口

八仙散

治杖打極重瘀血冲心不治卽死急服八厘好酒

送下

半夏

姜汁炒

巴豆霜

當歸

乳香

一九重者二九

桃花散

風化石灰

半升

大黃

八兩五錢

切片同炒灰色變紅放地上去火毒篩去大黃
研細摻傷處絹紫血止後葱湯洗淨換玉紅膏
卽長肉收斂忌房事發物

退風散

治破傷風不省人事角弓反張

防風

一錢

荊芥

五分

薄荷

七分

僵蚕

炒淨五分

川山甲

蛤粉

煨兩

乳香

胡椒

二兩

自然銅

二兩

大黃

四兩

沒藥

歸尾

桃仁

蘇木

五靈脂

紅花

赤芍

木香

五茄皮

血竭

青皮

無名異

甜瓜皮

各三兩炒

大戟

千金子

去油淨四兩

地鱉蟲

升

山荳根

五錢

山茨菰

二兩

硃砂

五錢

共爲末蜜丸彈子大硃砂爲衣再用金箔爲外

衣晒干入磁瓶內封固不可泄氣每服老酒下

覺藥力往來

乳香

沒藥

蘇木

降香

松節

各兩

川烏

五錢

自然銅

煨二兩

地龍

五錢

水蛭

五錢

血竭

五錢

生龍骨

五錢

土狗

十個

共研細末每服五錢陳酒調下隨症上下食前

後服

神仙保命丹

治跌打損傷癰疽發背

牛黃

冰片

五錢

射香

白芷

修天不聖
珠子 三分

冰片 三分

其爲細末摻傷口上生肌神效

七厘散

散瘀定痛

乳香

沒藥 各去油
淨一錢

巴霜 去油

血竭

自然銅 煨

礞砂

半夏 各錢

歸尾 二錢

共爲末每服七厘老酒下

四症神方

服藥之後週徧一身若遇傷處淅淅有聲病人自

治跌打損傷

巴霜

一錢
去毒

黑丹

一錢

大黃

一錢

血竭

五分

硃砂

一錢

射香

二分

共爲末酒漿爲丸綠豆大金箔爲衣壯人服五分
虛人三分小兒二分俱陳酒送下

八寶丹

治一切破傷出血時卽以此藥封之

琥珀

川連

龍骨

象皮

兒茶

輕粉

鳳凰衣

血竭

各一錢

太乙膏

治傷口不收貼之生肌長肉

香麻油

當歸

生地

生甘草

三味入油內燂枯去渣再以絲棉濾淨再入淨
鍋熬至滴水不散入炒飛黃丹八兩又用漫火
熬至滴水成珠取起少傾入白蠟黃蠟各一兩
微火再熬取起少定入去油淨乳香沒藥各五
錢攪勻收磁器內過三宿可貼

保命丹

寒發熱煩躁

乳香

去油淨

沒藥

去油淨

龍骨

各三錢

血竭

二錢

黃丹

五錢 飛過

香白芷

二錢 另

軟石膏

二兩 煨去火毒

樟腦

少許

共為細末磁器盛之每以摻患處止痛生肌

回陽玉龍膏

崙敷跌打損傷氣虛寒冷

草烏

二錢 炒

南星

一兩 煨

軍薑

二兩 煨

白芷

一兩

赤芍

二兩 炒

肉桂

五錢

共為末葱湯調搽熱酒亦可

補損接骨仙丹

治證同前

當歸

酒洗

川芎

白芍

熟地

補骨脂

五靈脂

廣木香

地骨皮

防風

各五錢

乳香

去油淨

沒藥

去油淨

血竭

各二錢

右剉一處用夜合花樹根皮五錢同入大酒壺內

加燒酒同煮一炷香取出溫服

止血定痛生肌散

治傷損等證失血過多或因尅伐致血氣耗損惡

白膠香一味爲細末敷之

補損續筋丸

治跌打撲墜骨碎筋斷肉破疼痛不息

當歸

五錢酒洗

川芎

白芍

炒

熟地

各三錢

廣木香

牡丹皮

乳香

去油

沒藥

各五錢去油

骨碎補

自然銅

紅花

硃砂

五錢

瓜兒血竭

三錢

丁香

一錢

人參

二兩

虎骨

二兩酥油炙

古銅錢

三錢

共爲細末煉蜜爲丸每服三錢黃酒童便化服

傷科要方卷四
處用生葱汁老酒和炒煖敷

止痛散

止痛消腫活血通經辟風驅寒

防風

荆芥

當歸

蘼艾

牡丹皮

鶴虱

升麻 各錢

苦參

鐵線透骨草

赤芍藥 各錢

川椒 三錢

甘草 八分

共爲末裝白布袋內紮口煎滾薰洗

白膠香散

治皮破筋斷

右藥以五月五日七月七日午時修合以前藥
汁拌石灰陰乾入黃丹三兩更杵爲細末凡有
傷折出血者用藥包封不可搖動約至十日可
瘥不膿不腫

定痛膏

治打撲傷損動筋折骨跌磕木石壓傷腫痛

芙蓉葉 三兩

紫荊皮

南星 生

白芷

各五錢

右藥共爲末加馬齒莧一兩搗極爛和藥末一

硃砂

麝香

丁香

烏梅肉

川烏

草烏

當歸

三柰 各錢

乳香 三錢

皂角

共爲細末用獨頭蒜泥爲丸以絲棉包裹塞於

鼻中

補肌散

止血除痛辟風續筋骨生肌肉

地黃苗

地菰

青蒿

蒼耳苗

赤芍藥

各五錢
水煎取汁

生艾汁

三合

烏龍膏

此膏治跌打損傷筋斷骨折腫硬青紫

百草霜 三錢

白及 五錢

白欬 三錢

百合 五錢

百部 三錢

乳香 三錢

沒藥 五錢

射香 一分

糯米 二兩 炒

陳粉子 炒 隔年者佳

共爲細末醋熬爲膏

塞鼻丹

此丹治跌打損傷鼻中流血不止神氣昏迷牙齒損傷虛浮腫痛者及一切衄血之證皆可用之

共爲末煉蜜爲丸每服三錢童便調下或黃酒亦可

疎血丸

此藥止血開胃

百草霜

三錢

好阿膠

蛤粉炒珠

藕節

側柏葉

茅根

當歸

各二兩酒洗

共爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服五錢早晚老酒送下

傷科補要卷之四

上海錢秀昌松溪氏編輯

男 丹書杏園

同較

婿何錦華鶴汀

附錄各家秘方

正骨紫金丹

治跌打撲墜閃錯損傷並一切疼痛瘀血凝聚

丁香

木香

瓜兒血竭

兒茶

熟大黃

紅花

各兩

當歸頭

蓮肉

白茯苓

白芍

各兩

丹皮

五錢

甘草

三錢

解百物毒

飲食中毒

中酒毒

解麪毒

解一切食毒

中蠚毒

食牛馬中毒

食斑鳩毒

解花椒毒

解諸菜毒

解半夏毒

解藜蘆毒

解雄黃毒

解杏仁毒

解服丹毒

解漆毒

解食鱧魚龜鼈

蝦蟆自死禽獸等毒

解藥蠱金石毒

解水銀入耳

解煤薰毒

解飲饌毒

治骨硬

解河魴毒

解火酒醉死

誤吞麥苳

誤吞銅鐵金銀

吞鍼

治諸骨硬

治稻苳糠穀硬

消吞頭髮

誤吞水蛭

諸蟲入耳

誤吞水銀

鐵針入肉

諸刺入肉

急救良方目錄

救中暈

救凍死

救魘

救中惡

救驚斃

救驚撲猝死

解砒毒

解巴豆毒

解蟹螯芫青毒

治菌毒

解毒葷

解草烏頭毒

解村囟毒

解輕粉毒

服酒

治吞金

杏仁湯

桔梗湯

車前湯

海桐皮湯

射香膏

藥酒方

八厘寶

楊花散

陰紅湯

血竭散

虎骨散

象皮膏

和傷治血湯

活血丹

透骨丹

入寶丹

七厘散

四症神方

神仙保命丹

桃花散

退花散

行軍金瘡方

八仙散

洞蠻方

閃氣散

回生丹

一粒金丹

鷄鳴散

君臣散

川芎湯

桂枝湯

蔓荊湯

杜仲湯

傷科補要

附錄各家秘方目次

正骨紫金丹

疎血丸

烏龍膏

塞鼻丹

補肌散

定痛膏

止痛散

白膠香散

補損續筋丸


補損接骨仙丹


止血定痛生肌散


回陽玉龍膏

太乙膏

保命丹







Comment

W 5

700

C5335

1818

pt. 4



455/5/

Beginning of Part 4